

R. FRIEDLÄNDER & SOHN  
Buchhandlung  
Berlin N.W. 6.  
11, Carlstrasse 11.





PRODROMUS

FLORAE

PROVINCIAE COMENSIS

20

PLANTARUM

A JOSEPHO COMOLLIO M. D.

IN LARIENSI PROVINCIA LECTARUM

ENUMERATIO

QUAM IPSE IN BOTANOPHILORUM USE  
ATQUE COMMODO EXHIBET

UTI

PRODROMUM FLORAE COMENSIS.

---

NOVO-COMI

EX TIPOGRAPHIA C. PETRI OSTINELLI

MDCCXXXIV.

1. 1. 17 / 1

→ 1. 1. 17 / 1



## PRAEFATIO

Cum primum a Munificentia AUGUSTISSIMI OPTIMIQUE IMPERATORIS ac REGIS nostri Medicus Provincialis renuntiatus fui, in animum induxi ea recolere et persequi studia, quae pro temporum qualitate neglecta jacuerant, atque vegetabilium, quae effuso gremio natura in multis nostrae ditionis partibus alit augetque; penitus inquirere species, ut officio simul et propensioni satisfacerem. Haud enim poteram ita facile pati, divitias ultro vel ipsis oculis occurrentes illorum, qui paullum laboris in peragationibus instituendis non abhorrent, parvifieri, et negligi; quamobrem montium atque vallium anfractus, locosque collinos ac planos percurrere iterum incoepi, posteaque diversis annorum temporibus, et cum exitu sat felici perlustravi, ita ut ab anno 1821 ad exeuntem plus 1300 stirpium species collegerim.

Inter montes, qui mihi perscrutanti uberio-  
rem exhibuerunt messem, enumerari merentur  
illi, qui ad lacum Larium, ad Valles *Intelevinam*,  
*Caverniam*, *Saxinam*, *Minacensem*, *Assinamque*  
pertinent. Silentio praeterire haud licet alios  
provinciae montes, uti illum *Leuco* imminen-  
tem *Resegone* nuncupatum, alterosque fere ad  
extremitatem Larii lacus septentrionalem supra  
pagos *Garbadonae*, *Domasii*, atque *Livii* positos,  
cum plurimas rariores plantas alant.

Quamvis in praesens consilium mihi non  
sit universae provinciae topographiae rationem  
hic reddere, tamen abs re non puto aliquot  
de praecipuis montibus, de illorum positione,  
altitudine, vegetatione, et formatione verba  
facere. (\*).

*Lineo* vulgo *Legnone*, ad Larii finem ex  
parte Orientem atque Septentrionem spectante  
situs, fastigium suum 8040 pedes parisienses  
supra mare mediterraneum juxta ultimas men-  
suras trigonometricas attollit. Mons iste regio-  
nem alpinam vel subnivosam attingit, nam in  
ejus summitate nix julio labente omnino lique-  
scit, et tantum in sinibus atque locis sole

---

(\*) Montium altitudinum indicationes mihi comiter praestantis-  
simus Amicus et Botanophilus Dynastes Weldenius suppeditavit;  
notitias vero de formatione aliquorum, quos non lustravi, mon-  
tium praebuit Dominus Julius Curionus diligentissimus mine-  
ralium provinciae studiosus; quibus viris gratias ago quam  
maximas in devoti animi argumentum.

fere invisis permanet. In editionibus jugis herbae pumiliones solum proveniunt, e. g. *Achillea nana*, *Anthirrinum alpinum*, *Arenaria biflora*, *Anthericum serotinum*, *Azalea procumbens*, *Arbutus alpina*, *Aretia alpina* et *vitaliana*, *Androsace imbricata*  $\beta$  *Decandolle*, vel *Aretia tomentosa* *Schleicher*, *Cherleria sedoides*, *Myosotis nana*, *Pyrethrum alpinum*, *Senecio abrotanifolius*, *Ranunculus glacialis*, *Silene acaulis*, *Juniperus nana*, rariores *Saxifragarum* atque *Salicum* species, aliaeque stirpes non communes, de quibus suâ vice erit verbum. In humilioribus partibus arbores et frutices montium atque collium incolae crescunt, uti *Fagus sylvatica*, *Castanea vesca*, *Corylus Avellana*, *Tilia europaea*, *Quercus Robur*, *Cytisus Laburnum*, *Sorbus Aucuparia*, *Pyrus Aria* cc. atque cum mediam pertingeris altitudinem, *Pinus Abies Larix Picea Muglusque*, *Daphnis Cneorum*, *Salix retusa*, *Rhododendron ferrugineum*, et *Betula nana* tibi obversantur.

Elevationis atque vegetabilium rariorum causâ aliorum montium numero post *Lineonem*, *Codenus* vel *Grinea*, (*la Grigna*) lacum inter et *Vallem Saxinam* positus se excerpit. Pedes 7428 ad verticem septentrionalem, et 6760 ad meridionalem altus, ipse pariter ad alpes summas referendus est. In editis illius jugis, ad quae ex partibus *Mandelli* et *Esini* per vias non difficiles

ascenditur, nonnullae species ex raris in occursum veniunt, quae rupium crepidines colunt, uti *Dryas octopetala*, *Lychnis alpina*, *Centaurea Rhapontica*, *Potentilla nitida*, *Papaver aurantiacum*, *Aquilegia pyrenaica*, et *Globularia medicautis*. Quamvis mons iste regionem nivosa haud pertingat, tamen glacies in quodam antro Septentrioni obverso toto anno perdurat, ita ut aëris temperies in illo etiam calidiore aestate ad 2 vel 3 gradus supra 0 thermometri *reaurmuriani* constanter permaneat.

Contra montem, de quo sermo fuit, ab Oriente ad Septentrionem Vallis *Saxinae* montes consurgunt, qui catenam satis longam consituunt. Sed de illis nunc taceam, cum omnes adhuc rimatus non sim, et solum alpem *Bianchino*, prataque circumstantia perscrutaverim, ubi *Gentianam nivalem*, *Cardaminem asarifoliam*, *Bupleurum caricifolium*, *Laserpitium pilosum*, *Drabam aizoidem*, *Lepidium alpinum*, *Cerastium alpinum*, *Betonicam hirsutam*, *Ligusticum austriacum*, *Seseli multicaule Retz*, *Seseli pumilum*, *Saxifragam stellarem*, atque *Aconitum Callibotryon Reichenbach* decerpsi. Vallem, de qua loquor, mediam interlabitur fluvius *Pluvierna*, cujus in alveo *Salix rosmarinifolia*, *Hippophaë Rhamnoides*, et *Tamarix germanica* proveniunt.

Cum montibus praedictae Vallis se jungit *Resegone* ob serratam ejus verticis formam ita

vocatus, qui ad Orientem *Leuce* situs summum jugum ad pedes 5778 extollit. In hujus montis cacumine, quod ex pago *Morterone* facile est pervium, complures stirpes haud communes incolunt, et *Saxifraga mutata*, *Allium pedemontanum*, *Phyteuma comosa*, *Buphtalmum speciosissimum*, *Campanula Rainerii*, *Carex baldensis*, et *Potentilla nitida* magnâ copîa nascuntur.

A dextera Larii parte *Mandello* obversa commodum est iter, quod ad cornigerum montem *Canzo* ducit, cujus elevatio 4230 pedes attingit. Prata atque pascua jugis subjecta tam a septentrionali quam a meridionali latere complurium herbarum alpinarum scatent. Vegetatio in hoc monte praecox est, cum nix exeunte aprili vel majo ineunte omnino evanescat. Hoc tempore florentes plerumque occurrunt *Primula Auricula*, et *Primula glaucescens Morettii*, *Ranunculus Thora*, *Anemone alpina*, *Viola gracilis Smith*, *Atragene alpina*, *Rhamnus pumilus*, *Iris graminea*, et pulcherrima *Saxifraga Vandellii* nullibi hactenus in provincia detecta. Praeter has species serius erumpunt ex rupium hiatusibus *Campanula Rainerii*, *Buphtalmum speciosissimum*, *Bupleurum petraeum*, *Spartium radiatum*, *Saxifraga caesia*, *Phyteuma comosa*, *Aquilegia pyrenaica*, atque formosum *Allium pedemontanum*.

Ad occidentem montis *Canzo* in conspectum venit Mons *Sancti Primi* Vallem *Assinam* inter et lacum *Larinum* situs, qui supra mare pedes 4914 eminent. In illo potissimum ex parte *Leceno* imminente permultae alpinae atque montanae stirpes vivunt, et *Buphtalmum speciosissimum*, *Campanula Rainerii*, *Phyteuma comosa*, atque *Carex baldensis* magnâ copiâ crescunt. Species istae usque ad oras lacus descendunt, et uberrime reperiuntur in *Cros-gallis* saxis. Ad hujus montis cacumen accessus arduus non est, vel ex *Bilacio* vel ex *Sormanno* conscendatur. In via multa observantur prata atque pascua tantum a meridie quantum a septentrione conversa, in quibus satis divitem vegetabilium messem botanophilus colligere potest. In planitie *Tivano* nuncupata, quae in medio montanae convallis hand procul a *Zelbio* supra *Nessum* jacet, et a lacu pedes 3566 elevatur, multae officinales, atque tinctoriae species obviam veniunt, uti *Aconitum Napellum* et *Lycotomum*, *Arnica montana*, *Gentiana lutea asclepiadea cruciata* et *amarella*, *Veratrum album*, *Astrantia major* et *minor*, *Actaea spicata*, *Digitalis lutea* et *ambigua*, *Ranunculus Thora*, *Carlina acaulis*, *Trollius europaeus*, *Serratula tinctoria*, *Genista tinctoria* &c.

A planitie praedieta ex occidentali parte descendens *Nessum* pervenitur, a quo brevis

est transitus ad oppositum *Arceii* pagum Valli *Intelevinæ* conterminum. Vallis ista Larium inter et Ceresii lacum posita satis amoena atque fertilis est, quamvis in superioribus partibus vites non recipiat. In sylvis atque nemoribus, quæ usque ad terminum arboreum occurrunt, *Fraxinus excelsior*, *Pyrus Aria*, *Sorbus Aucuparia*, *Corylus Avellana*, *Castanea vesca*, *Fagus sylvatica*, *Cytisus Laburnum*, *Quercus Robur*, *Quercus pedunculata*, *Acer pseudoplatanus*, *Alnus glutinosa* et *incana*, *Carpinus Betulus*, atque *Populus alba* et *tremula* abunde reperiuntur. *Juglans regia* circa pagos colitur, et cum illa *Pyrus Malus*, atque *Prunus Cerasus*. Montes hujus convallis attente perscrutari merentur, cum in illis plura sint prata atque pascea herbarum pulchriorum feracissima. Inter hos principem tenet locum mons *Generosus* vulgo *Galvagine* vocatus, qui fastigium summum ad pedes 5356 extollit, atque versus solis occasum super Ceresii lacum eminent. Specierum ditissimus horti fere imaginem refert, tanta est illius vegetationis varietas et copia. Prætermittis stirpibus aliis montibus communibus illas solum enumerabo, quæ rariores, atque alibi inventu haud faciles sunt. In pratis, quæ adscendenti obveniunt, permultæ umbelliferarum stirpes alpinae reperiuntur, inter quas recenseri oportet *Laserpitium Gaudinii*, quod hactenus monente

Amico carissimo *Morettio* cum *Laserpitio trilobo* male confusum fuit, *Laserpitium latifolium*, *Selinum austriacum Willd.*, *Ligusticum apioides Decand.*, et *Ligusticum peloponnense Linn.*, *Astrantia minor*, *Bupleurum stellatum*, atque *Carum Carvi*. In summo cacumine crescunt *Serratula discolor Willd.*, *Saxifraga oppositifolia*, *Campanula coespitosa Scop.*, et *Campanula linifolia Villars*, *Rhamnus pumilus*, *Salix lapponum*, *Cineraria aurantiaca*, *Achillea Clavennae*, *Primula Auricula*, *Thesium alpinum*, atque *Pedicularis rostrata fasciculata foliosa et incarnata*. In pascuis *Orimento* vicinioribus abundant *Hipchoeris helvetica*, *Carduus pannonicus*, et *Carduus transalpinus Suter*, *Anemone narcissiflora* atque *sulphurea*, *Hieracium villosum*, *H. amplexicaule*, *Anthericum Liliastrum* et *Liliago*, *Orchis nigra*, *Veratrum album*, *Uvularia amplexifolia*, *Gentiana purpurea* et *utriculosa*, aliaque hujus generis species, quas brevitatis ratione taceam.

Occidentem atque Septentrionem versus montes *Caverniae* Vallis assurgunt, ad quorum vertices ex *Porletia*, *Rhaecionico*, *Cremia*, et *Dunco* per vias non difficiles ascenditur. Horum montium acies altissima *Pizzo di Gino* vulgo nuncupatur, quae 6972 pedes elevationis supra mare mediterraneum pertingit. Ad ejus fastigium



haud paucae rariores species observantur, uti *Bartsia alpina*, *Arenaria biflora*, *Iberis rotundifolia*, *Ranunculus glacialis*, *Anemone alpina*, *Anthericum serotinum*, *Pyrethrum alpinum*, *Apargia crocea*, *Draba Aizoides*, *Daphne Cneorum*, *Lepidium petraeum*, *Azalea procumbens*, *Senecio abrotanifolius* et *incanus*, pluresque *Saxifragarum* species. In regione *Abietis* vivunt *Pinus Larix Picea* et *Mugho*, *Rhododendron ferrugineum* ac *hirsutum*, atque *Fagus sylvatica* ex arborum fruticumque familia; ad radices vero horum montium usque ad mapalia, quae a pagis parum distant, luxuriantur *Castanea vesca*, *Corylus Avellana*, *Acer Pseudo-Platanus*, *Acer Platanoides*, *Cytisus Laburnum*, *Tilia grandifolia* et *parvifolia Hoffm.*, *Quercus Robur* atque *Cerris*, *Carpinus Betulus*, *Sorbus Aucuparia*, *Populus alba*, *Pyrus Aria* &c. In hac convalle, quae nec vites nec moros alit, coluntur *Secale cereale*, *Hordeum vulgare*, *Cannabis sativa*, *Solanumque tuberosum*.

*Alpes Vallis Caverniae* magis septentrionales transeuntibus in conspectum se se offert *Sancti Jorii* mons convallibus *Dunci*, et *Zebiascae* in helvetica ditione conterminus, cujus altitudo 6096 pedum est. In ejus cacumine proveniunt *Phellandrium Mutellina*, *Apargia crocea*, *Achillea macrophylla*, *A. moschata*, *Arabis alpina*, *Arnica Doronicum*, *Astragalus montanus*, atque *Azalea*

*procumbens*, praeter alias stirpes alibi etiam vulgares. In descensu omnes arbores atque frutices regionibus subalpinis et montanis propriae satis copiose obversantur. Transactis vicis *Garzeno* atque *Germasino* in occursum venit *Dun-cum* oppidum fodinis martialibus, clibanisque memorabile, atque vino, frugibusque uberosum. Post hoc *Garbadona* atque *Domasium* oppida aedibus, vinetis, atque industria merito clara sinuatis ripis in longum producuntur, quibus montes asperi et cautibus horridi super eminent. Ad illorum fastigia altitudine *Caverniae* montes aequantia per vias arduas pervenitur vel ex parte *Livii*, vel ex illa *Bugialli* adscendatur. Sed de omnium vegetatione modo verba non faciam, cum cacumen mapalibus *di Arengo* imminens solum perlustraverim. In hoc plures mihi occurrerunt species, quas infrequentiae causâ nefas est praeterire silentio. Inter rupium hiatus *Sedum Rhodiola*, *Allium Victoralis*, *Aretia helvetica*, *Empetrum nigrum*, *Arenaria laricifolia* et *saxatilis*, permultae *Saxifragarum* species aliaeque stirpes cum *Lineone* communes hîc crescunt. In pratis et pascuis jugo subjectis plura vegetabilia alpina formâ non ignobilia collegi, uti *Bupleurum caricifolium*, *Betulam nanam*, *Juniperum nanam*, *Anthemidem alpinam*, *Arenariam bifloram*, *Cherleriam sedoidem*, *Cerastium alpinum*, *Guaphalium Leontopodium*,

*Veronicam aphyllam*, *Valerianam celticam*, *Senecionem incanum*, *Silenem acaulem*, *Anthericum serotinum*, *Ranunculum glaciale* &c. &c.

Postquam de praecipuorum atque magis memorabilium provinciae montium vegetatione verba fecerim, necessarium censeo aliquid dicere de illorum conformatione et natura. Cum Datio Comensis, inter latitudinis 45 et 46 atque longitudinis 26 et 27 gradus sita, alpibus ex septentrione, atque langobardae planitiei ex meridie finitima sit, omnes fere a geologis lapides atque terras distinctas comprehendit. In superioribus Larii partibus Rhaetis conterminis Granita, atque Schisti micacei reperiuntur, observanturque in inferioribus meridiem versus Schisti argilloso-micacei, qui non paucam occupant plagam. Montes *Domasio*, *Garbadonae*, et *Coleco* imminentes ex hisce petris constant, quae in Vallem *Saxinam* usque, et prope *Minnacium* se se extendunt. Inter hos altitudine et formâ memorabiliores sunt *Saxum acutum* in *Livii* convalle, quod nucleum graniticam habet, atque *Lineo*, cujus solum ad schistosum micaceum pertinet. Montes hujuscemodi formationis fodinis ferreis et cupreis abundant, quarum numerus in Vallibus *Dunci*, *Caverniae*, atque *Saxinae* notabilis est. Oportet hic monere cuprum quod effoditur sulphuri conditionem praebere, atque ferrum illam carbonati.

et solum martem ocraceam exhibere compositionem loco *Cajetae*, et sulphuratam in Valle *Saxina*.

Montes, qui praecedentes consequuntur, atque ad fines *Briantiae*, et agri *Varisiensis* se extendunt, omnes ex carbonatis calcaribus sunt constituti, atque ad secundarias spectant formationes. Carbonata haec revera omogenea non sunt, cum a calce carbonata compacta in alluminiferam bituminosam facile transmutentur. Inutile haud puto hîc dicere, formationem istam calcarem in primigeniorum montium dorsum impositam fuisse, atque a primordiis etiam in illos *Domasii* incubuisse, cum tantum illic, quantum in montibus inferioribus eorum vertices fere omnes ex carbonata calcare congerie obiecti videantur. Pluviae aliaeque meteorae, cum partes sublimiores continuo solverent atque in imum conjicerent, subjectum primum Schistum enudavere, quod de carbonatis calcaribus montium primigeniorum summitati impositis non accidit. Si vero in horum regionibus magnae carbonati calcaris secundarii moles nunc reperiuntur, haud infrequens est enudatam in regionibus calcaris secundarii massam schistosam primitivam conspicerem, quae in hoc casu basin montium transitionis constituit. Ex hisce calcareis secundariis montes *Codeno*, *Resegone*, *Generoso*, *Bisbino*, et *Canzo* constant, in

quibus crebro plumbet sulphureti fodinarum indicia observantur, quae etiam extant prope oppidum *Mandello* et pagum *Vicouago*, quibus in locis defossio incoepta relicta fuit, nescio an susceptorum imperitiâ, vel malae administrationis causâ.

In partibus provinciae magis ad meridiem et orientem conversis, ubi solum calcare secundarium deest, colles haud pauci obviam veniunt ex pudinga polygenia compositi, ut sunt illi *Como* viciniore, et *Briantaci*. Nonnullae ex his pudingis ope coementi argillacei, aliaeque calcaris connectuntur, originemque trahunt recentiore ex lapidea varii generis congerie calce mixta, quae ab aquis stagnantibus lacus antea forsitan conficientibus supeditata fuit.

Montibus secundariis praedictis, atque pudingis vetustioribus maximum argillae sedimen incumbit, quae meridiem versus ita se extendit, ut fere omnis langobardae planitiei solum constituat. Terra haec variis in locis diversas vestit formas, cum modo ferro hydrato onusta sit, modo heterogeneas partes excludat, ut bene ad vasa fictilia componenda se se accommodet, modo denique massam compactam in strata dispositam efficiat.

Ad perfectam provinciae topographiae imaginem reddendam oporteret de collibus, la-

cubus, fluviis, vallibus, planitie, paludibusque omnibus verba facere. Sed haec praetermittere nunc licet, cum omnes ditionis partes adhuc non peragraverim, cognitionesque ad hoc opus conficiendum necessariae in praesens mihi desint.


Antequam vero sermone finem adhibeam, monitos volo lectores, me in prodromum hunc elaborando systema immortalis *Linnaei* secutum esse, et generum specierumque nomina ex operibus celeberrimi *Willdenovii* fere omnia deprompsisse. Descriptiones stirpium, atque synonymiam omisi, et solummodo illarum, quas ipsemet vel legi vel vidi, enumerationem exhibui, stationem atque inflorescentiae tempus indicavi, ut botanophilorum commodo inservirem. Meis non credens viribus in dubiis speciebus statuendis humanitate praestantissimorum botanicorum *Dynastis Feldenii* montis *Rosae* topographi solertissimi et *Morettii* in Ticinensi Athenaeo rei agrariae Professoris celeberrimi usus sum. Amicorum carissimorum consiliis praesidiisque suffultus, pro quibus gratias ago quam maximas, opellae meae manum imposui, et illam ut potui absolvi spe fretus (cum plantarum, et ex illis rariorum, sponte in provincia crescentium indicem a nemine usque adhuc editum spectet) acceptam atque non inutilem in peragrationsibus fore illis, qui montes nostros

perscrutari ad herbarum messem faciendam sibi propositum habeant.

Si fata adversa mihi non erint, et omnes provinciae partes rimari concedant, majoris momenti opus aggrediar, universamque Comensem Floram elucubrabo, et in lucem proferam fidens aliquid utilitatis, nec non delectationis botanophilis, medicis, atque pharmacopolis allaturam, cum in illa vegetabilia clymate et statione dissimilia, ex quibus pleraque viribus medicinalibus praestantissima, enumerata viderint, quae apud nos multis in locis optime crescant, et mirâ varietate montes asperos exornant.







## CL. I. MONANDRIA.

### MONOGYNIA.

1. **HIPPURIS** *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 26.

Habitat in fossis aquosis prope Comum, et in lacubus  
Provinciae. Floret majo, junio, julio.

### DIGYNIA.

2. **CALLITRICHE** *verna* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 28.

Crescit in fossis aquosis et floret primo vere.

3. **CALLITRICHE** *autumnalis* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 29.*

Abundat in fossis aquosis locorum planitiei. Autumno  
floret.

4. **BLITUM** *virgatum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 50.

Legi in *Vulsola* locis aridis prope lacum. Fl. junio,  
julio, agosto.

## CL. II. DIANDRIA.

## MONOGYNIA.

5. **J**ASMINUM *officinale* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 40.

Crescit in sepibus multis in locis Larii Lacus, et in collibus circa Comum. Floret junio, julio.

6. **L**IGUSTRUM *vulgare* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 41.

Commune in sepibus floret aestate.

7. **O**LEA *europaea* Linn. *sp. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 44.

Colitur multis in locis Larii Lacus et in *Valsolda*.

Fl. junio. Dantur multae varietates.

8. **S**YRINGA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1.  
p. 48.

Sponte crescit in sepibus et sylvis circa Comum, *Torino* et in *Tremezzina*. Fl. aprili, majo.

9. **C**IRCAEA *lutetiana* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 53.

Abundat in locis umbrosis circa Comum, prope *Canzo*, et in Valle *Intelvi*. Fl. junio, julio.

10. **C**IRCAEA *alpina* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 53.

Oritur copiose in Montibus vallium *Intelvi*, *Cavargna*, et *Sasina*, atque floret julio, augusto. Haec species adscendit a termino Juglandis usque ad regionem subàlpinam.

11. **V**ERONICA *spicata* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 56.

Occurrit satis frequens in montibus *Corni di Canzo*, *Generoso*, et etiam in collibus *della Tremezzina*, atque in *Colico* ad radicem arcis *Fuentes*. Floret junio, julio.

12. VERONICA *officinalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 59.

Crescit in sylvis montanis prope *Comum*, aliisque provinciae locis. Fl. junio, julio, agosto.

13. VERONICA *aphylla* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 60.

Inveni in montibus *Iagnone*, *Corni di Canzo*, *Generoso*, *Grigna*, *Pizzo di Gino* &c. ubi se extendit a regione *Fagi* usque ad alpinaam inferiorem, et subnivosam. Fl. junio, julio.

14. VERONICA *fruticulosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 61.

Reperi inter saxa montium *di Mandello*, *Cavargna*, *Dongo* &c. Haec species occurrit a regione *Fagi* usque ad subnivalem. Fl. junio, julio.

15. VERONICA *alpina* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 63.

Nascitur in summis jugis montium *Lacus Larii*. Ego illam decerpsi florentem julio ad saxum supra *Musso* et in *Costa piatta* prope montem *Bellorona* dictum supra regionem *Fagi*.

16. VERONICA *serpillifolia* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 64.

Provenit ubique in pratis et in agris planitiei. Fl. vere.

17. VERONICA *Beccabunga* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 64.

Habitat in rivis et in fossis aquosis planitie ubique.

Fl. majo, junio, julio.

18. VERONICA *Anagallis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 65.

Crescit in fossis aquosis et rivis. Fl. majo, junio, julio, agosto.

19. VERONICA *scutellata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 65.

Haud rara ad oras lacuum *del Segrino* prope *Canzo*,  
*d' Alserio* prope *Erba*, *di Oggionno*, et in locis  
planioris Provinciae palustribus. Fl. majo, junio.

20. VERONICA *Teucrium* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 66.

Reperitur satis copiose in pratis et in sylvis humilio-  
ribus prope *Comum*. Fl. aprili, majo, junio.

21. VERONICA *Chamaedrys* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 1. p. 69.

Oritur ubique in pratis et pascuis. Fl. majo, junio.

22. VERONICA *urticaefolia* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 1. p. 70.

Abundat in umbrosis montium circa *Comum*, a *S.*  
*Maurizio* supra *Brunate*, al *Pertuso* supra *Blevio*,  
et in locis humentibus montis *Generoso* in regione  
Fagi. Fl. majo, junio, julio.

23. VERONICA *agrestis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 72.

Frequens in agris, in hortis, et in rudæratibus. Fl. primo  
vere.

24. VERONICA *Buxbaumii* Tenore. Fl. Neapol.  
T. 1. p. 7. Moretti in *Bibliot. ital.* T. XX. p. 80.

Occurrit in agris. Fl. vere et aestate.

25. VERONICA *arvensis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 75.

Habitat in arvis cultis ubique. Fl. martio, aprili.

26. VERONICA *hederifolia* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 75.

In hortis, agris, et ruderalis ubique. Fl. primo vere.

27. VERONICA *triphyllos* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 74.

Communis in agris. Fl. primo vere.

28. GRATIOLA *officinalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 102.

Habitat in multis Provinciae locis paludosis, et ad lacuum oras. Fl. majo, junio, julio, augusto.

29. PINGUICULA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 110.

Crescit in locis udis montium Vallium *Intelvi*, *Sassina*, &c. in regione Fagi. Fl. majo, junio.

30. PINGUICULA *grandiflora* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 110.

Legi in montibus Vallis *Cavargua*, *Tabano*, *Piazza Vachera* regionem alpinam inferiorem attingentibus. Fl. junio, julio.

31. PINGUICULA *alpina* Linn. *spec. pl. ed. 5. p. 25.*  
*P. flavescens* Schrader germ. 1. p. 55.

Habitat in montibus *Cauzo*, *Generoso*, *Codeno* a termino Fagi usque ad regionem *Mughi*. Fl. junio, julio.

32. UTRICULARIA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 112.

Crescit in fossis aquosis prati *Pagano* et in locis humidis *del Bassone*, *della Cù Franca* prope *Commum*. Fl. majo, junio, julio.

53. *UTRICULARIA minor* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 112.

Inveni cum praecedenti iisdem in locis sed rarius.  
Copiose mihi occurrit in uliginosis prope Lacus *di*  
*Alerio*, *del Segrino* et in palustribus *alla Cù Morta*  
prope Comum. Fl. majo, junio.

54. *VERBENA officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 120.

Nihil vulgatus passim ad vias et in ruderatis plani-  
nitiei. Fl. junio, julio.

55. *LYCOPUS europaeus* Linn. Spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 120.

Habitat ad fossarum margines, et in locis humidis  
umbrosis prope Comum et *Canzo*, atque in planitie  
*di Colico*.

56. *SALVIA pratensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 155.

Frequens in pratis ubique. Fl. totâ aestate.

57. *SALVIA glutinosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 145.

In locis collium et montium umbrosis oritur, et floret  
julio, augsto.

58. *SALVIA verticillata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 142.

Reperitur ad margines agrorum in collibus circa Co-  
mum. Fl. julio, augsto.

#### DIGYNIA.

59. *ANTHOXANTHUM odoratum* Linn. spec. pl.  
ed. Willd. T. 1. p. 156.

Crescit in pratis ubique. Fl. primo vere.

## CL. III. TRIANDRIA.

## MONOGYMA.

40. VALERIANA *rubra* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 175.

Reperitur in locis aridis et saxosis inter *Sala* et *Spurano*, et supra *Lenno* et *Bonzanigo* in *Tremezzina*.  
Inveni etiam a *S. Salvatore* supra *Erba*. Fl. majo, junio.

41. VALERIANA *divica* Linn. *Spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 176.

Habitat in locis uliginosis. Vidi sat copiose in sylvis prope *Laculum di Montorfano*. Floret aestate.

42. VALERIANA *officinalis* Linn. *Spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 177.

Provenit copiose in sylvis et in pratis collium et Montium prope *Comum*, et abundat ad agrorum margines a *Blerio*. Fl. majo, junio.

43. VALERIANA *tripteris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 177.

Crescit inter saxa et rupium rimas in Montibus *Canzo*, *Generoso*, *S. Primo*, et descendit a regione subalpina usque ad illam *Fagi*, atque ad oram *Larii Lacus alle Crosgalle* prope *Bellagio*. Fl. majo, junio.

44. VALERIANA *saxatilis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 179.

Prodit e rupium fissuris montium *Larii Lacus*, *Valium Cavargna* et *Sasina*, qui ultra 6000 pedes supra mare se se extollunt ec. Fl. majo, junio, julio.

45. VALERIANA *olitoria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 183.

Communis in arvis cultis inter segetes. Fl. aprili, majo.

46. POLYCNEMUM *arvense* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 192.

Habitat in arvis aridis collinis prope Comum. Fl. junio, julio.

47. CROCUS *sativus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 194.

Vidi a *Varena*, in horto *D. Mornigo*, ubi sponte crescit uti mihi relatum fuit. Colitur a me atque a praeclaro Medico *Ajcardo Castiglioni* in *Angera* cum exitu satis prospero. Fl. octobri.

48. CROCUS *vernus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 195.

Reperitur in omnibus fere Provinciae montibus, a termino *Fagi* usque ad regionem *Abietis*, et ultra. Fl. nive deliquescente.

49. GLADIOLUS *communis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 213.

Oritur in arvis multis in locis, a *Moltrasio*, in Valle *Intelvi*, ec. Fl. majo, junio.

50. GLADIOLUS *byzantinus* *Haiton Hort. Keavens.*  
*Gladiolus Lodovicae* Jan. ined.

*G. utrinque floridus* Bauh. pin. 41.

Legi in *Valsolda* prope pagum *Castello* atque in collibus circa *Erba*. Fl. junio, julio.

51. IRIS *germanica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 229.

Abundat inter saxa a *Geno*, ad arcem *Baradello*, in Valle *Intelvi* ec. Fl. junio, julio.



52. IRIS *pallida* Willd. *spec. pl. T. 1. p. 250.*

Reperitur in locis apricis prope Comum atque ad margines agrorum herbidos totius fere *Briantiae*. Fl. junio.

53. IRIS *Pseud-Acorus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 252.*

Communis in fossis planitiei et aquis lente fluentibus. Fl. maio, junio.

54. IRIS *graminea* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 255.*

Reperi in Monte *Canzo*, et *al Buco del piombo* supra pagum *di Erba*. Fl. junio, julio.

55. SCHOENUS *nigricans* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 261.*

Habitat in fossis aquosis, in paludibus planioris Provinciae, et in locis humidis montium. Fl. aprili, maio, junio.

56. CYPERUS *flavescens* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 279.*

Oritur in locis paludosis planioris Provinciae, in fossis *del Prato Pagano* prope Comum. Fl. junio, julio.

57. CYPERUS *fuscus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 280.*

Crescit in humidis planitiei pratis, et in agris uliginosis. Fl. junio, julio, agosto.

58. CYPERUS *longus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 285.*

Reperitur abunde in locis paludosis ubique. Fl. julio, agosto.

59. SCIRPUS *caespitosus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 292.*

Habitat in paludibus passim copiose. Fl. maio, junio, julio.

60. SCIRPUS *acicularis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 295.*  
 Nascitur in locis paludosis, et in aquis lente fluentibus prope Comum. Fl. junio, julio.
61. SCIRPUS *triquetus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 302.*  
 Abundat in locis uliginosis et in paludibus ubique. Fl. junio, julio.
62. SCIRPUS *setaceus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 298.*  
 Reperitur in locis palustribus prope pagos Bene, Porlezza, et Colico. Fl. junio, julio, agosto.
63. ERIOPHORUM *polystachium* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 312.*  
 Crescit in pratis humidis prope Comum, a Roascio, in Valle Intelvi ec. Fl. junio, julio, et serius in spongiosis montanis.
64. ERIOPHORUM *angustifolium* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. 313.*  
 Legi in quodam prato palustri supra Pellio in Valle Intelvi. Fl. julio, agosto.
65. NARDUS *stricta* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 314.*  
 Frequens est in Monte Legnone supra terminum Pini Picci, et Lariis. Observavi etiam, sed rarius, in aliis alpihus Lariensibus. Fl. junio, julio, agosto.
66. PHALARIS *arundinacea* Linn. *spec. pl. ed. 3. T. 1. p. 80.*  
 Oritur in pratis humentibus collinis et montanis prope Comum. Fl. maio, junio.

67. *Panicum verticillatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 554.

Crescit in arvis, et locis cultis satis copiose. Fl. junio, julio.

68. *Panicum viride* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 555.

Abundat in ruderatis et ad vias ubique.

69. *Panicum italicum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 556.

Colitur in arvis planioris Provinciae et minus copiose in locis montanis, et lacualibus. Fl. augusto, septembri.

70. *Panicum Crusgalli* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 557.

Frequens est in arvis, et etiam in ruderatis. Fl. julio, augusto.

71. *Panicum Burmanni* Willd. spec. pl. T. 1. p. 559.

*P. undulatifolium* Lam. Dict. 4. p. 745.

*P. Hirtellum* Allioni. Fl. pedem. n. 2180.

Repertum a me fuit in pluribus Provinciae locis, a Lucino nella Valle dei Dossi, al Ponte Molinello prope Comum ec. Fl. julio.

72. *Panicum sanguinale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 542.

Oritur ad vias, et in arvis ubique. Fl. julio.

73. *Panicum Dactylon* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 542.

Abundat ad vias prope muros, et in agris cultis. Fl. junio, julio.

74. *Panicum miliaceum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 548.

- Colitur multis in locis planioris Provinciae. Fl. augusto, septembri.
75. PHILEUM *pratense* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 554.  
Crescit in pratis ubique. Fl. majo, junio, julio.
76. PHILEUM *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 555.  
Mihì obviam venit in montibus *Legnone, Pizzo di Gino, Grigna supra Mandello, Corni di Canzo*. Frequenter regionem alpinam inferiorem attingit. Fl. junio, julio, augusto.
77. PHILEUM *Gerardi* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 555.  
Reperi in montibus *di Dongo, di Livo* et *Vallis Cavargna*. Fl. junio, julio.
78. PHILEUM *nodosum* Linn. spec. pl. Willd. T. 1. p. 555.  
Nascitur in pratis collinis et montanis, et etiam in pascuis planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.
79. PHILEUM *asperum* Host. gram. 2.  
*P. viride* Allionii. fl. ped. T. 2. p. 252.  
Legi ad arcem *Baradello* prope *Comun*. Fl. junio, julio.
80. ALOPECURUS *pratensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 557.  
Communis in pratis praesertim planioris Provinciae. Fl. majo, junio.
81. ALOPECURUS *agrestis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 557.  
Frequens est in agris et pratis. Fl. totà aestate.
82. ALOPECURUS *geniculatus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 558.

Reperitur in locis humentibus prope *Lacus di Montorfano*, *d'Alserio*, et in fossis aquosis circa *Commum*. Fl. totà aestate.

83. *AGROSTIS spica venti* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 561.

Provenit copiose inter segetes in omnibus fere arvis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

84. *AGROSTIS interrupta* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 562.

Crescit in agris cultis, et etiam in locis sterilibus aridis. Fl. majo, junio.

85. *AGROSTIS canina* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 567.

Vulgaris est in pratis humentibus planitiei. Fl. junio, julio.

86. *AGROSTIS stolonifera* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 569.

Oritur in pratis humidis, et in locis paludosis fere totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

87. *AGROSTIS hispida* Willd. *spec. pl. T. 1. p. 570.*  
A. *Capillaris* Linn. Fl. svec.

Habitat in pratis et pascuis praesertim planitiei. Fl. junio, julio.

88. *AIRA caespitosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 578.

Frequens est in pratis, et agris, tam in montium quam planitiei locis. Fl. junio, julio.

89. *AIRA flexuosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1. p. 578.

Crescit in pascuis montium aridis, et in locis saxosis collium. Fl. junio, julio.

90. *AIRA montana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 579.

Reperitur haud raro in locis montium aridis supra  
*Griante*, *Tremezzo*, *Bellagio* ec. Fl. junio, julio.

91. *AIRA cariophylla* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 580.

Habitat in pascuis siccis et in arvis circa *Comum*,  
et in pratis aridis montanis. Fl. junio, julio.

92. *MELICA ciliata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 581.

Abundat super muros prope *Comum*, et in locis  
apricis montanis. Fl. junio, julio.

93. *MELICA nutans* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 582.

Nascitur in sylvis praecipue montanis. Inveni etiam  
circa pagum *Lucino nella Valle dei Dossi*. Fl.  
majo, junio, julio.

94. *POA aquatica* Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 1. p. 585.

Occurrit frequenter in pratis paludosis, in fossis,  
aique ad ripas rivorum praesertim in planitie. Fl.  
junio, julio, agosto.

95. *POA trivialis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 587.

Vulgatissima est in pratis fere totius provinciae. Fl.  
majo, junio.

96. *POA angustifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 587

Crescit cum praecedente in pascuis siccis praesertim  
collinis. Fl. eodem tempore.

97. *POA pratensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 588.

Copiosa est in pratis omnibus. Fl. majo, junio.

98. *POA annua* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 591.  
Crescit ubique ad vias et juxta pastorum casas in montibus. Fl. junio, julio, augusto.
99. *POA Eragrostis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 592.  
Provenit in locis aridis et saxosis collium. Legi a S. Salvatore prope pagum Lezza. Fl. junio, julio.
100. *POA rigida* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 596.  
Copiose provenit in muris ubique. Fl. majore, julio.
101. *POA compressa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 597.  
Obvia est in ruderatis, in pratis, et etiam ad vias extra Commun. Fl. majore, junio, julio.
102. *POA bulbosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 599.  
Frequentissima est in locis aridis, etiam supra moenia urbis. Fl. junio, julio.
103. *BRIZA minor* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 404.  
Oritur copiose in pratis siccis tam montium, quam planitiei. Fl. majore, junio, julio.
104. *BRIZA media* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 404.  
Communis est in pratis et pascuis. Fl. eodem tempore ac præcedens.
105. *BRIZA Eragrostis* Willd. spec. pl. T. 1. p. 405.  
Nascitur multis in locis ad agrorum margines, in ruderatis, et in pratis siccioribus. Fl. majore, junio.
106. *DACTYLIS glomerata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 408.

Reperitur in omnibus pratis tam montium, quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.

107. CYNOSURUS *cristatus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 411.

Habitat in pratis et pascuis siccis satis frequenter. Fl. majo, junio.

108. CYNOSURUS *echinatus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 412.

Provenit in locis sterilibus et in ruderatis, et etiam inter segetes in agris collinis di *Garzola*, *Cannago*, *Carlano* prope Comum. Fl. majo, junio.

109. CYNOSURUS *coeruleus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 414.

Legi in monte di *S. Abbondio*, ad arcem *Baradello* prope Comum atque in aliis Provinciae locis. Fl. junio, julio.

110. FESTUCA *ovina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 419.

Occurrit in montibus *S. Primo*, *Corni di Canzo*, *Grigna* ec. et alibi a regione collina usque ad alpinam inferiorem. Fl. junio, julio.

111. FESTUCA *duriuscula* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 421.

Crescit in locis aridis, et in pratis siccis montium. Fl. majo, junio, julio.

112. FESTUCA *Myurus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 422.

Abundat in agris et in pratis siccis tam montium et collium, quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.

113. FESTUCA *elatio* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 425.

Crescit in omnibus fere pratis, et floret majo, junio.



114. *BROMUS secalinus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 428.

Frequens est in agris siccioribus, ubi vegetat cum frumento et secale. Fl. majo, junio.

115. *BROMUS mollis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 429.

Occurrit in agris inter segetes, atque in pratis et pascuis siccis. Fl. majo, junio.

116. *BROMUS squarrosus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 430.

Reperitur copiose ad margines agrorum, et etiam in pratis montium atque planitiei. Fl. majo, junio.

117. *BROMUS sterilis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 435.

Oritur in agris inter segetes, et in locis aridis sterilibus. Fl. junio, julio.

118. *BROMUS arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 434.

Vulgaris est inter segetes in agris arenosis. Fl. majo, junio, julio.

119. *BROMUS tectorum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 434.

Provenit in locis aridis, in ruderatis, et supra muros. Fl. majo, junio.

120. *BROMUS pinnatus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 438.

Mihi obviam venit in sylvis asperis Vallium *Intelvi*, et *Assina* ec. Fl. junio, julio.

121. *STIPA pennata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 440.

Reperi inter saxa in cacumine montis *di Pellio* supra *Gravedona*. Fl. junio, julio.

122. AVENA *elatior* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 445.

Habitat in agris et pratis ubique. Fl. majo, junio.

123. AVENA *sativa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 464.

Colitur in arvis praesertim in locis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

124. AVENA *fatua* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 447.

Crescit inter segetes, atque ad versuras agrorum, et rarius in pratis planitiei. Fl. majo, junio.

125. AVENA *sequitertia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 448.

Provenit ad margines agrorum in locis collinis prope Comum, a Geno, supra S. Agostino, a Garzola, Cardano ec. Fl. junio, julio.

126. AVENA *flavescens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 449.

Nascitur magnâ copiâ in pratis. Fl. majo, junio.

127. ARUNDO *Donax* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 454.

Colitur in hortis, atque in praediis, et fl. julio, agosto, septembri.

128. ARUNDO *Phragmites* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 454.

Habitat in locis paludosis, et in lacubus di Como, Pusiano, Oggionno, Segrino, Varese ec. Fl. agosto, septembri.

129. LOLIUM *perenne* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 461.

Abundat ad agrorum versuras, et inter segetes. Fl. majo, junio.

150. *LOLIUM temulentum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 462.

Crescit in agris inter segetes. Fl. majo, junio.

151. *SECALE cereale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 471.

Colitur in arvis tam planioris Provinciae, quam in locis  
collinis et montanis. Fl. majo, junio.

152. *HORDEUM vulgare* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 472.

Colitur in agris. Fl. majo, junio.

153. *HORDEUM murinum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 474.

Oritur in ruderatis, et in locis sterilibus. Fl. majo, junio.

154. *TRITICUM aestivum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 476.

Colitur in locis montanis Provinciae. Fl. junio.

155. *TRITICUM hybernum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 477.

Colitur in agris totius Provinciae. Fl. majo in planitie,  
serius in locis montanis.

156. *TRITICUM turgidum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 478.

Colitur in agris a *Garzola*, *Civiglio*, *Brunate*, *Pou-  
zate* prope Comum. Fl. majo, junio.

157. *TRITICUM repens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 481.

Habitat in arvis, in sepibus, in ruderatis, et etiam  
supra muros. Fl. junio, julio.

158. *LAPPAGO racemosa* Willd. spec. pl. T. 1. p. 484.

Crescit magnà copiâ ad murum Seminarîi extra moenia  
urbis. Fl. junio, julio.

139. HOLOSTEUM *umbellatum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 489.*

Reperi inter segetes in agris planioris Provinciae. Fl. aprili, maio.

140. POLYCARPON *tetraphyllum* Linn. *spec. pl. ed.* *Willd. T. 1. p. 490.*

Inveni in locis incultis et petrosis prope Arcem *Baradello*, et in agris supra *Geno*. Fl. junio, julio.

## CL. IV. TETRANDRIA.

### MONOGYNIA.

141. GLOBULARIA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 540.*

Nascitur abunde in locis apricis prope *Comum*, a *Geno*, *Garzola*, *Cannago*, &c. et in collibus montibusque totius fere Provinciae. Fl. maio, junio.

142. GLOBULARIA *cordifolia* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 541.*

Reperitur satis copiose in montibus fere omnibus *Larii* lacus, et provenit etiam in locis collinis aridis prope *Comum*. Fl. junio, julio.

143. GLOBULARIA *nudicaulis* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 542.*

Mibi obviam venit in monte *Codeno*, supra *la Ghiacciaja*, a *S. Primo*, atque *nelle Crosgalle* prope *Bellagio*. Fl. julio, augusto. Invenitur haud raro a termino *Fagi* usque ad regionem subnivosam.

144. *DIPSACUS fullonum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 545.

Colitur in agris prope suburbium *S. Martino* atque  
*a Lipomo*. Eius capita in usum veniunt ad carni-  
mandos lineos pannos. Fl. junio, julio.

145. *DIPSACUS sylvestris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 544.

Frequens est ad limites agrorum, et in locis sterili-  
bus prope aquas fluentes. Fl. junio, julio.

146. *DIPSACUS pilosus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 544.

Nascitur in locis humidis et umbrosis *Vallis Menaggio*  
prope *Bene*. Legi etiam in *Valle Intelvi*. Fl. junio,  
julio.

147. *SCABIOSA succisa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 548.

Occurrit laud raro in locis collinis et montanis pro-  
pe *Comum*, in *vallecula di S. Martino* ec. Fl.  
julio, augusto.

148. *SCABIOSA arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 550.

Abundat in pratis, et in marginibus agrorum collium.  
Fl. junio, julio, augusto.

149. *SCABIOSA sylvatica* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 551.

Communis est in pratis collinis et montanis prope  
*Comum*, in *Valle Intelvi* ec. Fl. junio, julio,  
augusto.

150. *SCABIOSA gramuntia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 551.

Legi in montibus *di Esino* et *Perledo* in *Valle Sa-*  
*sina*. Fl. julio, augusto, septembri.

151. SCABIOSA *columbaria* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 552.*

Oritur copiose in sylvis, et in pratis collinis prope Comum. Fl. julio, augusto.

152. SCABIOSA *graminifolia* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 558.*

Habitat in montibus Larii lacus, in rupibus delle *Crosgalle* prope *Bellagio, dei Corni di Canzo, della Grigna*, et inter saxa supra *Musso*. Haec species quae descendit usque ad oras lacus se se attollit fere ad regionem *Abietis et Mugli*. Fl. junio, julio, augusto.

153. SHERARDIA *arvensis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 574.*

Nihil vulgatius in arvis collium, et planioris Provinciae aridis. Fl. aprili, majo, junio.

154. ASPERULA *odorata* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 575.*

Crescit in montibus *Generoso, S. Primo, Canzo*, et supra *Brunate a S. Maurizio, al Pertuso* &c. Fl. junio, julio.

155. ASPERULA *arvensis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 576.*

Provenit in arvis praecipue collinis *di Garzola, Geno, Cardano, Blevio*, et etiam in aliis Provinciae locis minus cultis. Fl. majo, junio.

156. ASPERULA *taurina* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 576.*

Frequens in sepibus umbrosis prope Comum praesertim *a S. Abbondio*, in *Valle Intelvi*, et in montibus *Larii lacus*. Fl. majo, junio, julio.

157. ASPERULA *Cynanchica* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 579.*

Habitat in locis aridis collium prope Comum, et in agris siccis planioris Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

158. GALIUM *palustre* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 585.*

Reperitur in locis paludosis, et in pascuis humentibus Provinciae praesertim planioris. Fl. totâ aestate.

159. GALIUM *verum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 590.*

Nascitur in pratis et pascuis totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

160. GALIUM *Mollugo* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 590.*

Vulgatissimum est in sepibus ubique. Fl. junio, julio.

161. GALIUM *sylvaticum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 591.*

Oritur in sylvis tam collinis quam montanis. Fl. junio, julio.

162. GALIUM *purpureum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 595.*

Oritur in montibus atque collibus, et etiam prodit e rupium fissuris a Blevio, nelle Crosgalle prope Bellagio, et in aliis lacus Larii locis. Fl. junio, julio, augusto.

163. GALIUM *rubrum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 594.*

Invenitur in montibus Generoso, di Musso, Canzo, &c. Fl. junio, julio, augusto.

164. *GALIUM Aparine* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 597.

Occurrit frequenter in sepibus, et in ruderatis ubique.

Fl. majo, junio.

165. *PLANTAGO major* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 641.

Communis ad vias, et in pratis humidiusculis planioris Provinciae. Fl. junio, julio, agosto.

166. *PLANTAGO media* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 642.

Abundat in pratis et locis sterilibus praesertim collinis.

Fl. junio, julio, agosto.

167. *PLANTAGO lanceolata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 643.

Crescit secus vias, in pratis, in hortis ubique. Fl. majo, junio, julio.

168. *PLANTAGO albicans* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 645.

Mihi occurrit inter saxa in monte *Biandino* in Valle *Sasina*, et legi florentem incipiente augusto anni 1825. Reperta jam fuit a *Vandellio* in montibus *Nesso* et *Pai* in Valle *Sasina*.

169. *PLANTAGO alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 645.

Habitat in pratis montium *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio*, *Legnone* ec. supra terminos *Fagi* et *Abietis*, usque ad regionem alpinam inferiorem. Fl. junio, julio, agosto.

170. *EPIMEDIUM alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 660.

Mihi obviam venit in locis umbrosis montium Vallis



*Cavargna*, et in sylvis humilibus Vallis *Intelvi*.  
Fl. maio, junio, julio.

171. *CORNUS mascula* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 661.

Reperitur in sepibus et sylvis collinis, et colitur etiam  
in praediis atque in hortis. Fl. martio, aprili.

172. *CORNUS sanguinea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 662.

Vulgaris est in dumetis totius Provinciae. Fl. maio,  
junio.

173. *ISNARDIA palustris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 680.

Legi in fossis aquosis *del Prato Pagano*, *Bassone*,  
*Acqua negra* prope Commun. ec. Fl. junio, julio.

174. *TRAPA natans* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 681.

Provenit in lacu *di Varese* et in paludibus *di Por-*  
*lezza*, *Colico*, satis copiose. Fl. junio, julio.

175. *ALCHEMILLA vulgaris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 698.

Crescit in pratis et pascuis montium *Generoso*, *Can-*  
*zo*, *Bisbino*, *Boletto* ec. Fl. junio, julio.

176. *ALCHEMILLA montana* Willd. Enum. p. 170.

Crescit in locis asperis saxosis montanis, et fl. junio,  
julio.

177. *ALCHEMILLA alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 698.

Occurrit in omnibus montibus Larii lacus a termino  
Fagi usque ad regionem subnivosam, et abundat  
etiam inter saxa *delle Crosgalle* prope *Bellagio* ec.  
Fl. junio, julio, agosto.

178. *ALCHEMILLA Aphanes Willd. spec. pl. T. 1. p. 699.*  
 Communis in agris inter segetes. Fl. majo, junio.

## DIGYNIA.

179. *CUSCUTA europaea Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 702.*  
 Nimis frequens est in agris praesertim collinis infesta plantis leguminosis, *Trifolio*, et *Lino*. Reperitur etiam in sylvis prope Commum parasitica in *Erica vulgari*, atque in *Spartio Scopario*. Fl. majo, junio.

## TETRAGYNIA.

180. *ILEX Aquifolium Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 707.*  
 Oritur in omnibus fere montibus Provinciae, in quibus reperitur usque ad terminum Fagi. In sylvis *di Brunate*, et *S. Tommaso* occurrit etiam varietas foliis inermibus. Fl. aprili, majo.
181. *POTAMOGETON perfoliatum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 715.*  
 Habitat in Lario lacu, et in fossis extra moenia urbis. Fl. junio, julio.
182. *POTAMOGETON densum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 714.*  
 Habitat cum priore, et fl. eodem tempore.
183. *POTAMOGETON crispum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 714.*  
 Crescit in aquis lente fluentibus, in fossis urbis, et in lacubus Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

184. POTAMOGETON *pectinatum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 715.*

Reperitur in Abduca prope Sorico et Brivio, in Lario lacu, atque alibi in locis paludosis. Fl. julio.

185. POTAMOGETON *gramineum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 716.*

Vulgare in fossis atque locis paludosis. Fl. junio, julio.

186. SAGINA *procumbens* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 718.*

Reperitur in pascuis humentibus, atque in locis umbrosis collium et montium praesertim prope Comum. Fl. aprili, maio, junio.

## CL. V. PENTANDRIA.

### MONOGYNIA.

187. **M**YOSOTIS *scorpioides* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 746.*

Abundat in locis humentibus tam planitici, quam montium. Fl. maio, junio, julio.

188. MYOSOTIS *alpestris*. *Willd. enum. p. 175. Bertolon. Amoenit. ital. p. 540.*

Legi in montibus Larii lacus, et in Valle Intelvi. Fl. junio, julio.

189. MYOSOTIS *arvensis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 747.*

- Nihil vulgatius in arvis totius Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.
190. MYOSOTIS *nana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 747.  
Incolit in summis jugis montium *Legnone* et *Codeno*.  
Fl. junio, julio, agosto.
191. MYOSOTIS *Lappula* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 749.  
Invenitur in pratis, et in locis humentibus totius fere Provinciae, etiam in prato *Pasquè* dicto prope *Comum*. Fl. junio, julio.
192. MYOSOTIS *deflexa* *Wattenberg*.  
Habitat in summitate orientali montis *Canzo* supra pagum *Valmadrera*, et fl. junio, julio.
193. LITHOSPERMUM *officinale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 751.  
Crescit ad margines agrorum, in ruderatis, et etiam in sylvis collinis et montanis. Fl. majo, junio, julio.
194. LITHOSPERMUM *arvense* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 751.  
Provenit in arvis, et in sepibus praesertim collinis prope *Comum*, a *Cannago*, *Civiglio*, *Brunate* ec. Fl. aprili, majo.
195. LITHOSPERMUM *purpureo-coeruleum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 754.  
Mibi occurrit in agris collinis *di Garzola*, *S. Martino*, *Lora*, prope *Comum*. Fl. aprili, majo, junio.
196. ANCHUSA *officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 756.

Communis est in pratis, et arborum aggeribus praesertim collinis prope Commum, atque in locis herbosis della *Tremezzina*, di *Griante* &c. Fl. majo, junio, julio.

197. *CYNOGLOSSUM officinale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 760.

Abundat in locis collinis et montanis secus vias, in ruderatis, atque juxta sepes praesertim in Valle *Intelvi*, in *Tremezzina* inter *Lenno* et *Bonzanigo*, a *Cernobbio* prope Commum. &c. Fl. majo, junio, julio.

198. *CYNOGLOSSUM pictum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 761.

Crescit in locis aridis della *Tremezzina*. Fl. junio.

199. *PULMONARIA angustifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 768.

Frequens est in collibus et montibus totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo.

200. *PULMONARIA officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 768.

Nascitur in collibus et montibus ubique. Fl. martio, aprili.

201. *SYMPHYTUM officinale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 770.

Provenit satis copiose in locis umbrosis humidis totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

202. *SYMPHYTUM tuberosum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 771.

Abundat in pratis montanis, praesertim in monte *Canzo*. Fl. junio.

203. *BORRAGO officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 776.

Crescit fere spontanea in hortis, atque in viridariis.

Fl. aprili, majo.

204. LYCOPSIS *arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 780.

Habitat in agris, atque inter segetes haud raro. Fl.

aprilis, majo, junio.

205. ECHIMUM *italicum* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 786.

Occurrit in monte *Canzo*, et alibi. Fl. junio.

206. ECHIMUM *vulgare* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 787.

Reperitur ubique ad vias, atque margines agrorum.

Fl. majo, junio, julio.

207. ARETIA *heivetica* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 795.

Legi in cacumine *del Pizzo di Gino* in Valle *Cavargua* inter rupium fissuras. Fl. junio, julio.

208. ARETIA *alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 795.

Mihi obviam venit in summis jugis montium *Legnone*, *Pizzo di Gino*, et *Grigna* supra *Mandello* inter rupium rimas. Nunquam vidi infra terminum subnivalem. Fl. junio, julio.

209. ARETIA *vitaliana* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 796.

Habitat in monte *Legnone* supra regionem *Abietis*.

Fl. junio, julio.

210. ANDROSACE *villosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.

T. 1. p. 798.

Mihi occurrit in montibus *Legnone*, et *Codeno* prope summitatem. Fl. julio, augusto.

211. ANDROSACE *imbricata* Lam. *Dut. p.* 162.

*A. imbricata* Decand. *Fl. fr.*

*A. argentea* Gaertner.

Reperitur in monte *Legnone alla Porta dei Merli* parum longe ab ipsius vertice. Fl. julio, agosto.

212. ANDROSACE *carnea* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 1. p.* 799.

Crescit ad fastigia montium *Legnone, S. Jorio, et Pizzo di Gino* inter rupes. Fl. julio, agosto.

215. PRIMULA *veris* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1.*

*p.* 800.

Provenit in pratis et pascuis collium atque montium etiam prope *Comum*, et fl. majo, junio.

214. PRIMULA *acaulis* Linn. *spec. pl. T. 1. p.* 205.

*ed. 5.*

Habitat in pratis ubique. Fl. aprili, majo, junio.

215. PRIMULA *villosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 1. p.* 805.

Reperi ad rupes in monte *Legnone* a termino *Laricis* et *Abietis* fere usque ad ejus summitatem. Fl. junio, julio, agosto.

216. PRIMULA *Auricula* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 1. p.* 804.

Nascitur ad rupes in montibus *Generoso, Canzo, et S. Abbondio* prope *Comum*. Fl. aprili, majo, junio.

217. PRIMULA *integrifolia* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 1. p.* 805.

Reperi in cacumine montium *Legnone, et Codeno*. Fl. junio, julio.

218. PRIMULA *glaucescens* Morettii. *Diar. Ticinens.*

*Physiccs ec. Dec. 2. T. 5. p.* 249.

- Oritur prope cacumen occidentale montis *Canzo* versus *Valbrona* Fl. junio, julio.
219. PRIMULA *elatior* Willd. spec. pl. T. 1. p. 801.  
*P. inodora* Hoffman. germ. 67.  
 Abundat in pratis montis *Generoso* ad cacumen proximis, ubi legi junio florentem.
220. SOLDANELLA *alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 808.  
 Provenit in montibus *Larii* lacus, *Generoso*, *S. Primo*, et *Pizzo di Gino* a termino *Fagi* usque ad limitem subnivosum. Fl. nive deliquescente.  
*β. Soldanella Clusii.*  
 Habitat cum priori, et fl. eodem tempore.
221. CYCLAMEN *europaeum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 809.  
 Vulgatissimum est in sylvis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. junio, augusto, septembri.
222. MENYANTHES *nymphoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 810.  
 Reperitur in aquis lente fluentibus, in paludibus *di Porlezza*, *Colico*, et in fossis etiam prope *Comum*, ec. Fl. majo, junio, julio.
223. MENYANTHES *trifoliata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 811.  
 Crescit in pratis paludosis prope lacus *di Alserio*, *Pusiano*, *Segrino*, *Porlezza*, atque in paludosis *a Colico* ec. Fl. majo, junio.
224. HOTTONIA *palustris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 812.  
 Provenit in paludosis *a Cernobbio*, *Colico*, ec. Fl. junio.



225. *LYSIMACHIA vulgaris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 816.

Habitat in fossis, atque ad margines agrorum in locis planioris Provinciae humidiusculis. Fl. junio, julio, augusto.

226. *LYSIMACHIA Nummularia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 821.

Copiosa est in locis humidis, ad margines rivulorum, atque in pratis uliginosis. Fl. majo, junio, julio.

227. *ANAGALLIS arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 821.

Nascitur in arvis, atque in hortis, et floret junio, julio, augusto.

228. *AZALEA procumbens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 832.

Incolit in montibus *Legnone*, *Bellorona*, *Pizzo di Gino*, et *Costa piatta* in Valle *Cavargna*, atque in illis reperitur a termino *Fagi* usque ad limitem subnivalem. Fl. junio, julio.

229. *CONVOLVULUS arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 844.

Nimis frequens est in arvis totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

230. *CONVOLVULUS sepium* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 844.

Communis est in sepibus. Fl. majo, junio, julio.

231. *JASIONE montana* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 888.

Occurrit copiose in sylvis collinis et montanis etiam prope *Comum*. Fl. majo, junio, julio.

232. *CAMPANULA rotundifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 892. C

Abundat in montibus *Generoso*, *Codeno*, *Biandino*,  
*Pizzo di Gino*, cc. etiam ultra terminum Fagi.  
 Fl. junio, julio.

β. *C. pusilla* Willd. spec. pl. T. 1. p. 895.

γ. *C. caespitosa* Scopoli. Carn. 1. p. 145. T. 4.

Reperitur inter saxa montis *Generoso*, et alla *Pli-*  
*niana*. Fl. junio, julio.

253. CAMPANULA *linifolia* Willd. spec. pl. T. 1.  
 p. 895.

*C. Scheuchzeri*. Villars. Delph. 2. p. 505.

Legi in montibus, *Generoso*, *Canzo*, *Mandello*,  
*S. Primo* supra *Bellagio*, ad cacumina inter rupium  
 fissuras. Fl. julio, agosto.

254. CAMPANULA *patula* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
 T. 1. p. 896.

Obviam mihi venit ad margines agrorum a *Bellagio*,  
 in Valle *Intelvi*, atque in aliis Provinciae locis.  
 Fl. julio, agosto.

255. CAMPANULA *Rapunculus* Linn. spec. pl. ed.  
 Willd. T. 1. p. 896.

Habitat in pratis totius Provinciae, et fl. junio,  
 julio. A nonnullis colitur in hortis, et manducatur  
 in acetariis incipiente vere.

256. CAMPANULA *persicifolia* Linn. spec. pl. ed.  
 Willd. T. 1. p. 897.

Frequens occurrit in sylvis, atque in locis incultis  
 praesertim planioris Provinciae. Fl. maio, junio.

257. CAMPANULA *urticifolia* Linn. spec. pl. ed.  
 Willd. T. 1. p. 900.

Crescit cum praecedente in sylvis montanis, et floret  
 eodem tempore.

238. CAMPANULA *Rapunculoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 901.

Habitat ad margines agrorum in locis collinis, et copiose invenitur in herbosis siccis Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio.

239. CAMPANULA *Trachelium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 905.

Invenitur in sylvis ubique. Fl. maio, junio.

240. CAMPANULA *glomerata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 905.

Legi in Valle *Intelvi* in pascuis apricis, et in sylvis di *Pellio inf.* et *Laino*. Fl. julio, agosto.

241. CAMPANULA *Cervicaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 904.

Occurrit in vallecula di *S. Martino* prope *Comum* in sepibus, atque in pratis collinis Lanificio vicinioribus. Fl. junio, julio.

242. CAMPANULA *barbata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 908.

Abundat in pratis montium Vallium *Intelvi* et *Cavargna*, a limite *Juglandis* usque ad terminum *Fagi*. Fl. junio, julio.

243. CAMPANULA *Rainerii*: caule subuniifloro, foliis ellipticis, dentato-crenatis, pubescentibus, calycinis laciniis lanceolatis, dentatis, plerumque glabris, corollis duplo minoribus.

*C. Rainerii* *Perpentii*. *Bibl. Ital. ann.* 1817. T. 5. p. 154. c. icon.

Radix perennis, repens, stolonifera, fibrosa, gracilis, transversalis, et ramosa. Caulis plerumque simplex, duos vel tres pollices longus, adscendens, pilis

brevissimis obtectus, sæpe uniflorus. Folia inferiora petiolata per petiolum decurrentia, superiora subsessilia, elliptica, remote dentata, margine ciliata, pubescentia, apice obtusa. Calyx ultra medium 5-fidus, laciniis erectis, subdentatis, nunc glabris nunc ciliatis, acuminatis, basi violaceus scaber, breviter pedunculatus. Corolla nuda, duplo calyce amplior, coerulea, laciniis latis, patulis, acutis. Filamenta brevissima, capillaria; Anthacrae filamentis triplo majores, oblongae, incrassatae, erectae, flavescentes. Germen inferum, angulatum; Stylus filiformis, teres, pilosus, staminibus quadruplo longior; stigma tripartitum, crassiusculum, laciniis revolutis, pilis albis raris instructum. Capsula angulata, obovata, scabra, trilocularis, polysperma, apice dehiscens.

Species, cujus descriptionem hîc exhibui, primitus detecta a Domina *Caudila Perpentì* fervidâ Botanices cultrice prope *Cortenova* in Valle *Sasina*, reperta a me fuit postea ad rupes in montibus *Cauzo*, *Grigna*, atque inter scopulos *delle Cros-galle* prope *Bellagio*. Vidi etiam et legi in alpibus *Biandino*, *Tremare* supra *Mandello*, et *Resegone* a termino Fagi usque ad altitudinem 6,000 pedum, et ultra.

244. CAMPANULA *spicata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 909.

Provenit in montibus Vallis *Intelvi*, et in pratis sepibusque Vallis *Assina* praesertim prope pagos *di Asso*, *Lasnigo*, *Barni*. Reperitur etiam in aliis Provinciae locis. Fl. junio.

245. CAMPANULA *Speculum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 912.

Communis est in arvis inter segetes ubique. Fl. majo, junio, julio.

246. CAMPANULA *thyrsoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 905.

Hæc species mihi obviam venit in pratis della *Valmeria* supra pagum *Mandello* Fagi regioni superioribus. Fl. julio, augusto.

247. PHYTEUMA *Scheuchzeri* Willd. spec. pl. T. 1. p. 919.

Legi in pratis montium *Generoso*, *Vallis Cavargna*, *S. Jorio* ec. ubi ascendit ultra terminum Fagi. Fl. majo, junio.

248. PHYTEUMA *Michelii* Willd. spec. pl. T. 1. p. 920.

Reperitur in montibus *Canzo*, *Generoso*, *Boletto* supra *Comum*. Hæc species obviam venit solummodo in pratis regionem subalpinam non superantibus, et fl. majo, junio.

249. PHYTEUMA *comosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 921.

Habitat in montibus *Canzo*, *S. Primo*, *Codeno*, *Resegone*, *Pizzo di Gino*, *Grona* et etiam in scopulis delle *Crosgalle* loco dicto *la Valle maggiore*. Species ista incolat regionum alpinarum, atque subalpinarum descendit usque ad oras lacus *Larii*, et reperitur variis in locis inter rupium fissuras.

250. PHYTEUMA *orbicularis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 921.

Frequens est in muris propugnaculorum urbis, et

inter saxa montium *Como* viciniorum; crescit etiam in pratis subalpinis in Vallibus *Cavargna* et *Sasina*. Fl. junio, julio.

251. PHYTEUMA *betonicæfolia* Willd. spec. pl. T. 1. p. 922.

Occurrit in Monte *Canzo*, ubi florentem legi junio.

252. PHYTEUMA *spicata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 925.

Obyiam venit in sylvis umbrosis collinis prope *Comum*, aliisque Provinciae Ioris. Fl. junio, julio.

255. PHYTEUMA *ovata* Willd. spec. pl. T. 1. p. 925.

*P. Halleri* Allion. Fl. ped. T. 1. p. 116.

Crescit sat copiose in pratis montis *Generoso*, et fl. junio, julio.

254. PHYTEUMA *humilis* Schleicher. Append. Fl. Helvet. Sutter. p. 422.

Reperi in montibus *Legnone*, et *S. Jorio*. Fl. julio, augusto.

255. LONICERA *Caprifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 982.

Haud infrequens in sepibus collium, et in sylvis praesertim circa *Comum*, et in *Brianza*. Fl. majo, junio.

256. LONICERA *nigra* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 985.

Invenitur non raro in montibus comensibus, praesertim in sylvis *di Brunate*, *Blevio*, *Civiglio*, *Ponzate*. Fl. majo, junio.

257. LONICERA *Xylosteum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 986.

Habitat in montibus, atque in sepibus collium cum

prioni, a *S. Maurizio* supra *Brunate*, ad *Pertuso* supra *Blevio*. Fl. majo, junio.

258. *LOMCTERA alpigena* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 987.

Obviam mihi venit in montibus *Carzo*, *Generoso*, *di Ponzate*, *Bellagio*, et *Esino* locis nemorosis a termino *Juglandis* usque ad limitem *Fagi*. Fl. majo, junio.

259. *VERBASCUM Thapsus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1001.

Hæc species occurrit raro in locis *Provinciae* plurioris. Ego solummodo vidi in *Valle Intelvi*, et nonnulla specimina legi in horto amici *Domini Canonici Feretti a Laino*. Fl. junio, julio, agosto.

260. *VERBASCUM phlomidis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1002.

Abundat in ruderatis, atque in locis sterilibus totius fere *Provinciae*. Fl. a junio ad septembrem.

261. *VERBASCUM Lichnitis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1005.

*V. Lichnitis* Willd. var.  $\beta$ .

Crescit in collibus et montibus prope *Comum*, et in locis aridis circa pagos *di Cernobbio*, *Moltrasio*, et *Laglio*. Fl. junio, julio, agosto.

262. *VERBASCUM floccosum* Walldst. et Kitaib. pl. var. Hung. 1. p. 81. Willd. Enum. p. 224.

Reperitur non raro in locis sterilibus saxosis, et in alveo torrentis *Cosia* prope *Comum*. Fl. junio, julio, agosto.

263. *VERBASCUM nigrum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1004.

Habitat in sepibus collinis, atque in locis aridis sylvaticis praesertim a *Blevio*. Hujus speciei plures inveni varietates. Fl. junio, julio.

264. VERBASCUM *Blattaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1005.

Provenit sat copiose ad vias, ad margines agrorum planioris Provinciae, praesertim prope pagos *di Grandate, Civello, Lucino*, &c. Fl. junio, julio, agosto.

265. VERBASCUM *Weldenii* Braun. inedit. Moretti. Diar. Ticin. Physic. Dec. 2. T. 5. p. 45.

Haec species, forsitan varietas *V. Lichnitis*, occurrit ad viam, quae *Leucum* ducit variis in locis, praesertim prope *Erba* et *Villa Albese*. Fl. julio, agosto.

266. VERBASCUM *Thapsoides* Schrader. Monogr. Verbasce.

Oritur in locis aridis sterilibus prope *Comum*, etiam in alveo torrentis *Cosia*. Fl. junio, julio, agosto.

267. VERBASCUM *heterophyllum* Morettii. Diar. Ticin. Physic. Dec. 2. T. 5. p. 111.

Nascitur prope *Comum*, et primitus repertum fuit a valenti Botanico *Braune*, qui specimina illustri *Dynasti Weldenio* amico meo spectatissimo communicavit. Ego inveni et decerpsi hanc speciem in alveo torrentis *Breggia* circa pagum *di Cernobbio*. Fl. julio.

268. DATURA *Stramonium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1008.

Crescit in locis incultis circa *Comum*, et abundat in glareosis a *Sorico* ad finem *Larii lacus*. Fl. julio, agosto.



269. *HYOSCIAMUS niger* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1010.  
Provenit in ruderatis, et locis sterilibus prope Comum,  
et alibi. Fl. junio, julio.
270. *ATROPA Belladonna* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1017.  
Invenit in montibus di Schignano, S. Bernardo supra  
Carate, et in Valle Menaggio supra Bene. Fl. ju-  
nio, julio.
271. *PHYSALIS Alkekengi* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1022.  
Frequens est in locis umbrosis collinis prope Comum, et  
in sylvis a Blevio et supra Geno. Fl. junio, julio.
272. *SOLANUM Dulcamara* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1028.  
Abundat in sepibus praesertim in locis udis Provinciae  
planioris. Fl. majo, junio, julio, augusto.
273. *SOLANUM nigrum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1055.  
Vulgatissima species in ruderatis, et etiam ad vias  
urbis. Fl. julio, augusto.
274. *SOLANUM villosum* Willd. enum. p. 256.  
S. nigrum  $\gamma$ . Linn. Willd. spec. pl. 1. p. 1055.  
Habitat cum praecedente in hortis, in ruderatis, atque  
ad vias, et floret eodem tempore.
275. *CHIRONIA Centaurium* Willd. spec. pl. T. 1.  
p. 1068.  
Crescit copiose in pratis collinis totius fere Provinciae.  
Fl. junio, julio.
276. *RHAMNUS catharticus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1092.

Habitat in sylvis et sepibus praesertim collinis. Fl. majo, junio.

277. RHAMNUS *saxatilis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1094.

Reperitur in locis collinis et montanis, al Ponte Molinello prope Comum, inter saxa montis di Griante, nelle Crosagalle prope Bellagio ec. Fl. aprili, majo, junio.

278. RHAMNUS *pumilus* Linn. Mantiss. p. 49. Willd. sp. pl. T. 1. p. 1097.

Erumpit e rupium fissuris ad cacumina montium Canzo, Generoso, et Codeno. Legi florentem junio, julio.

279. RHAMNUS *Frangula* Linn. ed. Willd. spec. pl. T. 1. p. 1098.

Communis est in sylvis umbrosis et dumetis circa Comum, atque in aliis Provinciae locis. Fl. majo, junio.

280. EVONIMUS *europaeus*. Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1150.

Abundat in sepibus ubique. Fl. aprili, majo.

281. VIOLA *hirta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1162.

Provenit in montibus prope Comum, supra S. Giuliano, et S. Agostino in locis aridis. Fl. aprili, majo.

282. VIOLA *odorata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1163.

Oritur in locis collinis et montanis circa sepes, et ad margines agrorum. Fl. februario, martio.

283. VIOLA *canina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1164.

Frequens est ad sepes, et in sylvis ubique. Fl. martio, aprili.

284. VIOLA *montana* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1164.*

Nascitur in pascuis et sylvis montium Vallis Intelvi, et Bisbino, atque fl. aprili, maio.

285. VIOLA *biflora* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1167.*

Obviam mihi venit in montibus Generoso, S. Primo, Falmeria supra Mandello, et Pizzo di Gino in Valle Cavargna inter rupes soli fere invisas. Nunquam inveni infra regionem Pagi. Fl. maio, junio, julio.

286. VIOLA *tricolor* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1168.*

*V. tricolor.* *β.* Willd. *spec. pl. p. 1168.*

*β.* *V. arvensis* Murr. *prodrom. p. 75.*

*V. bicolor arvensis.* Bauh. *pin. 200.*

Crescit varietas hujus speciei  $\alpha$  in pratis montium, et  $\beta$ . ad margines agrorum ubique. Fl. a maio usque ad septembrem.

287. VIOLA *lactea* Smith. *Fl. graec.*

Crescit in silvis montis di S. Abbondio prope Comum. Fl. aprili.

288. VIOLA *gracilis* Smith. *Fl. graec.*

*V. heterophylla* Bertolon. *rar. ital. pl. dec. III. p. 55. et Amoenit. ital. p. 87.*

Reperi ad cacumen montis Canzo, et legi florentem junio, julio, et etiam agosto.

289. IMPATIENS *Nolitangere* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1176.*

Oritur copiose in locis udis Vallis *Intelvi* praesertim circa pagos *di Laino*, *Pellio inferiore*, *Schignano*.  
Fl. junio, julio.

290. HEDERA *Helix* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 1179.

Parasitica in muris atque in arboribus ubique. Fl. junio, julio.

291. VITIS *vinifera* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 1180.

β. *V. vinifera sylvestris*.

Colitur haec planta fere in omnibus Provinciae locis. Ejus var β. reperitur satis frequenter in sepibus. Fl. junio.

292. THESIMUM *linophyllum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1211.

Reperitur magnâ copiâ in sylvis collinis et montanis prope *Comun a S. Abbondio*, ad arcem *Baradello*, *al Ponte Molnello*, *a Cardano* ec. Fl. <sup>2</sup> majo, junio.

293. THESIMUM *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1212.

Occurrit in montibus *Legnone*, et *Codeno* supra *Mandello*, ubi anno elapso floridum legi julio, augusto.

294. VINCA *minor* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1252.

Crescit ubique in sepibus, et fl. martio, aprili.

295. VINCA *major* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1255.

Nascitur in sepibus cum praecedente, et fl. eodem tempore.

296. ASCLEPIAS *Vincetoxicum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1268.*

Frequens est in sylvis et locis incultis; provenit etiam in urbe *at Terraggio di Porta Sala*. Fl. mayo, junio.

297. HERNARIA *glabra* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1296.*

Habitat in arvis siccioribus, et in locis glareosis planioris Provinciae. Fl. mayo, junio.

298. HERNARIA *hirsuta* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1297.*

Mihi obviam venit in arvis apricis circa pagum di *Lucino at Roncaccio*, et legi florentem julio.

299. CHENOPODIUM *Bonus Henricus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1299.*

Nascitur in montibus frequenter circa casas pastorum, et floret junio, julio.

300. CHENOPODIUM *urbicum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1299.*

Provenit ad muros, et in ruderatis circa Comum. Fl. junio, julio, agosto.

301. CHENOPODIUM *murale* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1301.*

Abundat ad muros, atque in fimetis circa urbem, et in aliis Provinciae locis. Fl. junio, agosto, et etiam septembri.

302. CHENOPODIUM *opulifolium* Decand. *Fl. fr. T. 5. p. 3172.*

Inveni in ruderatis, atque ad margines agrorum prope Comum, et etiam circa pagos di *Villa Albese*, et *Erba*. Fl. agosto, septembri.

505. CHENOPODIUM *album* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1502.*  
 β. *C. viride* Linn. *spec. pl. Willd. T. 1. p. 1505.*  
 Nasceitur utraque varietas in hortis, et ad margines agrorum. Fl. julio, augusto, septembri.
504. CHENOPODIUM *Botrys* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1504.*  
 Crescit in arenosis fluminis Abduae circa pagos di *Sorico, et Colico*. Fl. julio, augusto.
505. CHENOPODIUM *Vulvaria* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1505.*  
 Haud rarum est in ruderatis, et ad muros prope urbem, atque in aliis Provinciae locis. Fl. julio, augusto.
506. CHENOPODIUM *polyspermum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1505.*  
 Commune est in hortis, in arvis, atque ad margines agrorum totius fere Provinciae. Fl. julio, augusto.
507. CHENOPODIUM *Scoparia* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1506.*  
 Colitur in agris prope Comum, et sponte provenit in locis incultis praesertim planioris Provinciae. Fl. julio, augusto.
508. ULMUS *campestris* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1524.*  
 Oritur in sylvis montanis, et colitur in vineis ad sustinendas vites. Fl. martio, aprili, maio.
509. ULMUS *suberosa* Willd. *spec. pl. T. 1. p. 1524.*  
 Habitat in sylvis cum praecedenti, et fl. eodem tempore.
510. GENTIANA *lutca* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1551.*

Occurrit in montibus *Codeno*, et *Trenare* supra *Mandello* abque *Pasturo*, nec non in monte *Bobbio* supra *Barsio* in *Valle Sasina*; nunquam vidi in montibus *Vallium Intelvi* et *Cavargua*, II. julio, agosto.

511. GENTIANA *purpurea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1551.

Nascitur copiose supra regionem *Fagi* in montibus *Vallium Intelvi*, et *Sasina* præsertim a *Bianolino*, et *di Dongo a S. Jorio*. Fl. junio, julio, agosto.

512. GENTIANA *asclepiadica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1554.

Habitat in omnibus fere *Provinciae* montibus, ubi crescit copiose in pratis terminis *Fagi* et *Abietis* proximis. Fl. julio, agosto.

513. GENTIANA *cruciata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1554.

Legi in sylvis montium *Vallium Intelvi*, *Cavargua*, et *Sasina* regionem *Fagi* haud superantibus. Fl. julio, agosto.

514. GENTIANA *acaulis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1540.

Frequens est in montibus *Generoso*, *S. Primo*, *Gordona*, *Pizzo di Gino*, *S. Maurizio* supra *Brunate*, et *Boletto* supra *Ponzate*. Haec species observatur in pratis et pascuis collinis atque subalpinis, et reperitur etiam in regionibus alpinis. Fl. majo, junio, julio.

515. GENTIANA *verna* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1542.

Reperi in pratis montium *Vallis Cavargua*, in *Costa*

*piatta, in Aigua, a Tabano, in Piazza Vachera ec.*  
Fl. majo, junio.

316. GENTIANA *utriculosa* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 1545.*

Occurrit in pascuis omnium fere montium Larii lacus,  
et Vallium *Cavargna, Sasina ec.* Fl. junio,  
julio.

317. GENTIANA *nivalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1544.*

Mihi obviam venit in Monte *Biandino* prope lacu-  
lum sub jugo *del Pizzo dei tre Signori* ultra  
terminum *Abietis*. Fl. julio, agosto.

318. GENTIANA *amarella* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1547.*

Haud rara est in montibus *di Tremezzo, Griante,*  
*Vallis Menaggio, Rezzonico, Dongo, Cavargna ec.*  
Fl. julio, agosto, septembri.

319. GENTIANA *ciliata* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1551.*

Crescit in pratis montium *Vallis Cavargna, Generoso,*  
*Canzo ec.* Fl. julio, agosto, septembri.

320. ERYNGIUM *amethystinum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 1558.*

Habitat in glareosis prope pagos *di Suello, Pusiano,*  
*Civate.* Fl. julio, agosto.

321. ERYNGIUM *campestre* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1558.*

Habitat prope pagos *di Lecco, Mandello, Olginate,*  
*Valgreghentino.* Fl. agosto, septembri.

322. SANICULA *europaea* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1566.*



Provenit in sylvis montium circa *Comun, di Brianate, Ponzate* ec. a regione Juglandis usque ad limum Fagi. Fl. majo, junio, julio.

523. *ASTRANTIA major* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1568.

Abundat in pratis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. junio, julio.

524. *ASTRANTIA minor* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1568.

Communis est in pratis montium *Vallis Intelvi*, et reperitur etiam in pascuis atque in sylvis circa pagos *di Pello inf.* et *Laino*. Vidi pariter et legi in montibus *Vallium Cavargna*, et *Sasina*. Haec species quae obviam venit usque ad terminum *Pini Piccae* et *Abietis* descendit in quibusdam locis in pascuis regionis Juglandis. Fl. junio, julio.

525. *BUPLEURUM rotundifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1569.

Vulgare in arvis planioris Provinciae fl. majo, junio.

526. *BUPLEURUM stellatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1570.

Oritur in montibus *Canzo, Generoso, Pizzo di Gino, Legnone, Codeno, Bellorona* inter limites regionum Fagi, et *Abietis*. Fl. junio, julio.

527. *BUPLEURUM graminifolium* Willd. spec. pl. T. 1. p. 1570.

Decerpsi in cacumine montis *Canzo*, ubi crescit inter saxa. Fl. julio, agosto.

528. *BUPLEURUM caricifolium* Willd. spec. pl. T. 1. p. 1571.

Inveni inter saxa in monte *Bianchino* supra *Introbio* ultra Fagi regionem. Fl. agosto.

529. BUPLEURUM *Ranunculoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1574.

Crescit in pratis prope juga montium Vallis Cavargna, di Dongo, Livo, ec. nunquam infra terminum Abietis. Fl. junio, julio.

530. CAUCALIS *grandiflora* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1585.

Frequens est in arvis collinis, atque ad sepes. Fl. junio, julio.

531. CAUCALIS *Anthriscus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1588.

Provenit ubique in sepibus, atque in arvis incultis. Fl. junio, julio.

532. CAUCALIS *nodosa* Willd. spec. pl. T. 1. p. 1588.

Abundat in sepibus collium prope Comum, atque in locis apricis sterilibus della Brianza. Fl. junio, julio.

533. DAUCUS *Carota* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1589.

Nascitur abunde in pratis ubique, et fl. majo, junio, julio.

534. CONIUM *maculatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1595.

Occurrit haud raro in ruderatis circa Comum, atque locis umbrosis montium, collium, humiliorisque Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

535. SELINUM *sylvestre* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1596.

Reperitur in sylvis montanis Vallium Intelvi, Cavargna ec. Fl. julio, augusto, et etiam septembri.

536. SELINUM *austriacum* Willd. spec. pl. T. 1. p. 1597.

Habitat in pascuis udis montium Vallium *Intelvi*, *Carargua*, *Sasina* non ultra regionem Fagi. Fl. julio, augusto.

357. SELIMUM *Carrifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1598.

Oritur in pratis, et sylvis humentibus collinis et montanis. Fl. junio, julio.

358. ATHAMANTA *Cervaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1401.

Occurrit frequenter in montibus Vallis *Sasina*, *di Esino*, *Perledo* ec. atque in locis siccis collinis circa Comum inter Fagi et Abietis regiones. Fl. julio, augusto.

359. ATHAMANTA *Orcoselinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1403.

Vulgatissima species ad margines agrorum collium in tota fere Provincia. Fl. julio, augusto, septembri.

360. ATHAMANTA *cretensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1404.

Crescit copiose ad cacumina montium *Resegone*, *S. Primo*, *Sasso di Gordona*, *Grigna* inter rupium fissuras, et provenit etiam inter saxa *alla Croce di S. Eutichio* supra Comum in regione collina. Fl. julio, augusto.

361. PEUCEDANUM *officinale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1405.

Legi in monte *Biandino* supra Fagi regionem. Fl. julio, augusto.

362. PEUCEDANUM *alsaticum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1407.

Inveni multis in locis tam montanae quam humilioris

Provinciae ad margines agrorum. Fl. julio, augusto, septembri.

543. LASERPITIUM *latifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1414.

Oritur in pratis montis *Generoso*, ad *Orimento*, nec adscendit ultra terminum *Fagi*. Fl. julio, augusto.

544. LASERPITIUM *Gaudinii* Moretti. ined.

Haec species diversa a *Laserpitio trilobo* Linn. mihi obviam venit in pratis montium *Generoso*, *Canzo*, *Grigna* supra *Mandello*, et *Resegone*. Haud vegetat ultra regionem alpinam inferiorem. Fl. julio, augusto.

545. LASERPITIUM *dauricum* Willd. sp. pl. T. 1. p. 1417.

Reperi in monte *Legnone* ultra *Abietis* regionem. Fl. julio, augusto.

546. LASERPITIUM *peucedanoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1418.

Habitat in montibus *di Esino* supra *Perledo*, *Resegone*, *Codeno*, et *Valmeria* supra *Mandello*. Fl. julio, augusto.

547. LASERPITIUM *Siler* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1418.

Abundat in scopulis *delle Crosgalle* prope *Bellagio*, *del Sasso Rancio*, atque in rupibus montium *Vallis Cavargna*, *Dongo* &c. Incola regionis alpinae descendit usque ad oras *Larii* lacus. Fl. junio, julio, augusto.

348. LASERPITIUM *hirsutum* Willd. spec. pl. T. 1. p. 1420.

L. *Halleri*. Allion. pedem. n. 1315.

- Inveni inter rupium fissuras variis in locis montis *Legnone* supra regionem Abietis. Fl. julio, augusto.
349. LASERPITUM *simplex* *Lam. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1421.*  
Nascitur in montibus *Legnone*, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio* inter limites regionum Abietis, et *Mughi*. Fl. julio, augusto.
350. HERACLEUM *Sphondylium* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1421.*  
Frequens est in pratis etiam humilioris Provinciae. Fl. julio, augusto.
351. LASERPITUM *pilosum* *Willd. enum. p. 310.*  
Inveni in monte *Biandino* supra *Introbbio* in Valle *Sasina*, atque in pratis *della Valmeria* supra *Mandello*, et legi florentem augusto. Haec species haud frequens nostris in alpihus occurrit locis praedictis a regione Fagi usque ad terminum Abietis.
352. LIGUSTICUM *austriacum* *Jacq. Willd. spec. pl. T. 1. p. 1426.*  
Mihî obviam venit in monte *Biandino* in Valle *Sasina* supra Fagi regionem. Fl. julio, augusto.
353. LIGUSTICUM *peloponense* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1425.*  
Oritur in pratis montis *Generoso*, circa *Orimento*, quo in loco regionem subalpinam vix attingente solummodo mihi occurrit. Fl. julio, augusto.
354. LIGUSTICUM *apioides* *Decand. Fl. fr. T. 4. p. 508.*  
Crescit in pratis montis *Generoso* regionem Fagi haud superantibus. Fl. junio, julio, augusto.
355. ANGELICA *sylvestris* *Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1429.*

Abundat in locis humidis umbrosis, atque ad margines rivorum tam in montibus et collibus, quam in planiore Provincia. Fl. julio, agosto.

556. *SIUM angustifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1451.

Frequens est in fossis, atque ad margines rivorum lente fluentium in locis humilioris Provinciae, et etiam circa Comum. Fl. junio, julio.

557. *SIUM nodiflorum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1452.

Habitat in fossis extra urbem, et in pratis humentibus variis in locis, atque a *S. Giuseppe in Valleggio* prope Comum. Fl. junio, julio, agosto.

558. *SIUM Falcaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1454.

Legi ad margines agrorum herbidos prope *al Castello di Bellagio* in regione collina, ubi floridum ioveni agosto.

559. *OENANTHE fistulosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1440.

Occurrit in locis palustribus prope pagos *di Erba, Colico, Porlezza*, et in fossis *dell'Acqua Negra, Prato Pagano* ec. Fl. junio, julio.

560. *OENANTHE crocata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1441.

Mihi obviam venit circa lacusculum *del Piano* prope *Porlezza*, ubi florentem legi julio.

561. *PHELLANDRIUM aquaticum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1444.

Reperitur in locis palustribus prope *Erba*. Fl. majo, junio, julio.

562. *PIELLANDRUM Mutellina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1444.

Provenit copiose in montibus editis Latii lacus, di Dongo, S. Jorio, Pizzo di Gino, Bellorona a termino Fagi usque ad regionem alpinaam inferiorem. Fl. julio, augsto.

563. *CICUTA virosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1445.

Collegi ad oras Lucusculi d'Alverto. Fl. junio, julio.

564. *AETHUSA Cinapium* Willd. spec. pl. T. 1. p. 1446.

Abundat in hortis, ubi crescit inter olera. A nonnullis pro Apio *Petroselinio* legitur, atque recipitur non sine periculo in usum coquinarium. Fl. totâ aestate.

565. *SCANDIX odorata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1449.

Inveni in sylvis montanis di Blevio. Fl. junio, julio.

566. *SCANDIX Pecten* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1449.

Nascitur in agris inter segetes praesertim in locis siccioribus et apricis, a Garzola, Camnago ec. Fl. aprili, majo, julio.

567. *SCANDIX Antriscus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1450.

Communis est ad sepes, atque in locis incultis totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo.

568. *SCANDIX Cerefolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1450.

Colitur sed raro in hortis, ubi fl. majo, junio, julio.

569. *CHAEROPHYLLUM sylvestre* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1452.

Hæc species est nimis frequens in sepibus collinis ubique. Fl. majo in locis humilioribus, et junio in montibus.

370. CHAEROPHYLLUM *temulum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1474.

Habitat in arvis, in ruderatis, et in sepibus montium atque collium totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

371. CHAEROPHYLLUM *hirsutum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1555.

β. *C. hirsutum minimum* Vandellii. op. inedit.

Obvenit mihi hæc species in montibus *Legnone*, *Resegone*, *Codeno*, et varietatem a *Vandellio* descriptam reperi in monte *Bianlino*. Incola regionis alpinae inferioris descendit etiam infra terminum *Fagi*. Fl. julio, agosto.

372. IMPERATORIA *Ostruthium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1458.

Oritur in montibus fere omnibus *Larii* lacus, et *Vallium Cavargna*, *Sasina*, atque *Valmeria* supra *Mandello*, in quibus observatur a limite *Fagi* usque ad terminum *Abietis*. Fl. julio, agosto.

373. SESELI *montanum* Linn. Var. β. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1459.

β. *S. multicaule* Retz. Ob. 3. p. 27.

Hæc varietas mihi occurrit in monte *Bianlino* supra regionem *Fagi*, et decerpsi florentem agosto.

374. SESELI *annuum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1. p. 1460.

Nascitur in collibus *della Brianza* circa *Erba*, *Lezza*, et etiam in locis aridis montanis prope *Comum*. Fl. agosto, septembri, octobri.



575. *PASTINACA sativa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1466.*  
 Communis est in pratis, atque ad margines agrorum  
 ubique. Fl. junio, julio, agosto.
576. *CARUM Carvi* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1.*  
*p. 1470.*  
 Copiose crescit in pratis omnium fere montium Larii  
 lacus. Fl. junio, julio.
577. *PIMPINELLA Saxifraga* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 1471.*  
 Habitat in montibus fere omnibus Provinciae praesertim ad rupes. Fl. julio, agosto.
578. *PIMPINELLA nigra* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1471.*  
 Nascitur in sepibus, atque in locis apricis aridis col-  
 lium. Fl. agosto, septembri, octobri.
579. *PIMPINELLA magna* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 1471.*  
 β. *P. Saxifraga major umbellâ rubente Bauh. pin. 159.*  
 Oritur in pratis montanis et collinis satis frequenter,  
 et varietas β. provenit in pascuis montis *Generoso*.  
 Fl. julio, agosto.
580. *PIMPINELLA dioica* Linn. *Mantiss. p. 557.*  
*Willd. spec. pl. T. 1. p. 1474.*  
*Seseli pumilum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 1.*  
*p. 575.*  
 Decerpsi hanc speciem in montibus *Biandino*, *Grigna*  
 supra *Mandello*, et *Resegone*. Nunquam mihi obviam  
 venit in locis Provinciae collinis. Fl. julio, agosto.
581. *AEGOPODIUM Podagraria* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 1. p. 1476.*

Abundat in hortis, in sylvis umbrosis, atque in sepibus collium et etiam planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

## TRIGYNIA.

582. RHUS *Cotinus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1485.

Reperitur in locis petrosis ad oras lacus Larii, nelle *Crosgalle*, a *Griante*, *Nobiallo*, *Rezzonico* ec. Fl. majo, junio.

583. VIBURNUM *Lantana* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1489.

Frequens est in sepibus, et sylvis praesertim collinis circa *Comum*. Fl. majo, junio.

584. VIBURNUM *Opulus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1490.

Habitat ad sepes, atque in locis humentibus collium et planioris Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

585. SAMBUCUS *Ebulus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1494.

Invenitur ad vias, aggeres, atque in locis udis incultis praesertim planitiei. Fl. junio, julio.

586. SAMBUCUS *nigra* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1495.

Vulgatissima species in sepibus totius Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

587. SAMBUCUS *racemosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1496.

Mihi occurrit in montibus *di Nesso*, *Lezzeno*, *Bellagio*, in quibus ultra regionem *Fagi* laud adscendit. Fl. junio, julio.

588. STAPHYLEA *pinnata* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 1497.

Abundat in sepibus, atque in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. majo, junio.

589. TAMARIX *germanica* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 1499.

Provenit secus Abduam in planitie di Colico, atque in alveo torrentis Pioverna in Valle Sasina prope pagos di Pasturo, Introbbio, Primaluna, et Taccuo. Fl. junio, julio.

590. ALSINE *media* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 1.  
p. 1511.

Creseit ubique in hortis, atque ad vias etiam urbis. Fl. majo, junio, julio.

#### TETRAGYNIA.

591. PARNASSIA *palustris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 1516.

Habitat in pratis montanis et collinis totius fere Provinciae, atque occurrit etiam in locis umbrosis udis circa Comum, et in palustribus prope pagum di Cernobbio. Fl. julio, augusto.

#### PENTAGYNIA.

592. LINUM *usitatissimum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 1555.

Colitur in agris collium et planitiei multis in Provinciae locis. Fl. majo, junio.

593. LINUM *narbonense* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 1555.

Reperi hanc speciem inter rupes montis *Generoso*,  
atque supra *il Sasso di Musso*. Fl. junio, julio.

594. LINUM *tenuifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1536.

Oritur in locis aridis montanis humilioribus *della  
Tremezzina, di Musso*, et etiam prope *Comum*  
supra *Geno, S. Giuliano, Garzola*. Fl. junio,  
julio.

595. LINUM *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 1.  
p. 1658.

Nascitur in editis montibus *Vallis Cavargna, Codeno*,  
inter saxa nunquam infra regionem *Mughi*. Fl.  
junio, julio.

596. LINUM *catharticum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1541.

Crescit satis copiose in locis herbidis, atque in pascuis  
siccioribus a regione collina usque ad terminum  
*Fagi*. Fl. maio, junio.

597. DROSERA *rotundifolia* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 1. p. 1545.

Inveni circa lacusculos *di Montorfano, del Segrino*,  
prope *Canzo*. Fl. junio, julio.

598. DROSERA *longifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1544.

Occurrit mihi in plerisque locis paludosis *Provinciae*.  
Fl. junio, julio.

599. CRASSULA *rubens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 1559.

Crescit in locis collinis aridis etiam circa *Comum*.  
Fl. junio, julio.

## CL. VI. HENANDRIA.

## MONOCYNIA.

400. **G**ALANTHUS *nivalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 29.

Frequens est ad radices montium etiam prope Comum, a *Geno*, *Blevio*, *Cannago*, atque in pascuis elitioribus *di Brunate*, *Civiglio*, *Ponzate* ec. H. niye deliquescente.

401. **L**EUCOIUM *vernum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 30.

Abundat in pratis, atque in locis herbidis umbrosis collium et montium prope Comum. Fl. martio, aprili.

402. **L**EUCOIUM *aestivum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 30.

Crescit in pratis humentibus circa Comum, et praesertim prope pagum *di Cernobbio*. Fl. junio, julio.

403. **N**ARCISSUS *poeticus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 34.

Provenit copiose in pascuis montanis *di Brunate*, *Civiglio*, *Ponzate*, *Blevio* ec. Fl. aprili, maio.

404. **N**ARCISSUS *Pseudo-Narcissus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 35.

Oritur in pratis prope Comum, atque in aliis planioris Provinciae locis. Fl. aprili, maio.

405. **A**LLIUM *Porrum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 64.

Haec species colitur in hortis ad usum culinarium. Fl. majo, junio.

406. ALLIUM *Victorialis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 65.

Reperitur in montibus editioribus Larii lacus, di *Dongo, Livo, Bugiallo*. Fl. julio, agosto.

407. ALLIUM *sativum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 68

Excolitur in omnibus hortis, et floret aestate.

408. ALLIUM *carinatum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2.

Inveni in sylvis collium prope Comum, a *Carlano, Lucino, Montorfano* &c. Fl. junio, julio.

409. ALLIUM *Sphaerocephalon* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2. p. 70.

Nascitur satis frequenter inter saxa a *Geno*, supra *S. Agostino* prope Comum, atque in montibus Larii lacus. Fl. junio, julio.

410. ALLIUM *descendens* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 71.

Legi in monte *Varena* supra *Perledo* secus viam, quae ducit ad *Esino*. Fl. julio, agosto.

411. ALLIUM *paniculatum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 75.

Non infrequens est in monte di *Brunate*, inter rupes a *Falgiojera, S. Donato, Carascione*, &c. Fl. tota fere aestate.

412. ALLIUM *senescens* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 75.

Haud rarum est in montibus Vallium *Intelvi* atque *Cavargna*. Vidi etiam et legi al *Ponte Molinello* prope Comum. Fl. julio, agosto.

415. ALLIUM *ursinum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 79.

Crescit in pratis iudis circa pagos *di Lucino*, *Grindate*, et *Montelompino*, atque in pascuis monti *Canzo* subjectis. Fl. aprili, maio, junio.

414. ALLIUM *pedemontanum* Willd. spec. pl. T. 2.  
P. 77.

Reperi inter rupes ad summitatem montis *Canzo*, et legi floridum julio, augusto. Vidi etiam in editis jugis montium *Codeno* et *Resegone*.

415. ALLIUM *bulbiferum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 1. p. 85.

Abundat in sylvis collinis, atque in pascuis montium totius fere Provinciae, a *S. Abbondio*, ad *Ponte Molinello*, a *Carlano* ec. prope *Comum*. Fl. junio, julio.

416. ALLIUM *Martagon* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 88.

Habitat in pascuis montis *Generoso*, ad *Orimento*, *alla Cassina*, et occurrit etiam in montibus *di Canzo*, *Ponzate* ec. Fl. junio, julio.

417. UVULARIA *amplexifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 95.

Inveni in pratis montis *Generoso* prope *Orimento*. Fl. junio, julio.

418. ERYTHRONIUM *Dens canis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 96.

Provenit copiose in locis umbrosis montium prope *Comum*, praesertim in sylvis secus viam, quae a *Camerlata* ducit ad *Lora*. Fl. aprili, maio.

419. ORNITHOGALUM *umbellatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 65.

Occurrit in pratis, hortis, atque arvis ubique. Fl. aprili, majo.

420. ORNITHOGALUM *pyrenaicum* Linn. spec. pl. 440.

O. *Stachyoides* Willd. spec. pl. T. 2. p. 116.

Reperitur in pratis montis *Canzo* supra *S. Miro*, atque *alle Cassine*. Incolit etiam alios Provinciae montes, uti *S. Primo*, *Resegone*, *Codeno*. Fl. junio, julio.

421. SCILLA *bifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 128.

Vulgatissima est in sylvis, sepibus, atque pratis udis collium et montium *Como* propiorum. Fl. majo, junio.

422. ASPHODELUS *albus* Willd. spec. pl. T. 2. p. 155.

A. *ramosus*  $\beta$ . Linn. spec. pl. p. 415.

Obvenit mihi in pratis montis *Generoso*, ad *Orimento*, *alla Cassina* ec. Fl. junio, julio.

423. ANTHERICUM *serotinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 154.

Crescit in monte *Legnone* in pascuis loco dicto *la Concia* proximis, atque prope *la porta dei Merli*. Hanc speciem nunquam reperi in locis regioni subalpinae inferioribus. Fl. julio, augusto.

424. ANTHERICUM *Liliago* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 141.

Commune in pratis montium Provinciae fere omnium. Fl. majo, junio.

425. ANTHERICUM *Liliastrum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 142.



Crescit in pratis montis *Generoso* supra *Orimento*,  
*alla Cassina*, et prope *Erbono*. Fl. majo, junio.

426. ASPARAGUS *tenuifolius* Lam. *Dict.* 1. p. 294.  
*A. officinalis*  $\beta$ . Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2.  
 p. 150.

Vidi et legi supra *S. Giuliano* prope *Comum*, atque  
 in montibus *di Brienzo*, et *Canzo*. Fl. majo, junio.

427. CONVALLARIA *majalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
 T. 1. p. 160.

Habitat in sylvis umbrosis supra *Brunate a S. Mau-*  
*rizio*, *Ponzate al Boletto*, atque in nemoribus  
 montium *di Villa Albese*, *Lezza* ec. Fl. majo,  
 junio.

428. CONVALLARIA *verticillata* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd.* T. 1. p. 161.

Nascitur in locis herbidis, atque in sylvis montium  
*Vallium Intelvi*, *Cavargna*, *Canzo*, et a *S. Mau-*  
*rizio* supra *Brunate*. Fl. majo, junio.

429. CONVALLARIA *Polygonatum* Linn. *spec. pl.*  
*ed. Willd.* T. 1. p. 161.

Provenit in sylvis collium et montium satis copiose,  
 et fl. majo, junio.

430. CONVALLARIA *multiflora* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd.* T. 1. p. 162.

Oritur in montibus *Vallis Intelvi*, in pratis *del Sasso*  
*Gorlona*, atque in sepibus circa pagos *di Pello*  
*inf.*, et *S. Fedele*. Fl. majo, junio.

431. CONVALLARIA *bifolia* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd.* T. 2. p. 164.

Reperi in locis humidis atque umbrosis montium  
 totius fere *Provinciae*. Fl. majo, junio, julio.

452. HYACINTHUS *comosus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 169.

Vulgaris in arvis collinis prope Comum. Fl. aprili, majo.

453. HYACINTHUS *racemosus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 170.

Frequens est in locis herbidis collium prope Comum, et etiam in propugnaculis urbis, atque in hortis illis propioribus. Fl. aprili, majo.

454. AGAVE *americana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 192.

Crescit sponte in rupibus a *Varenna*, atque prope pagum *Albogasio* in *Valsolda*. Plantae adultiores fl. julio, augusto.

455. HEMEROCALLIS *flava* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 197.

Reperi *alla Pliniana* post rivulum propiorem *alla Riva di Molina*, et legi florentem junio labente.

456. JUNCUS *effusus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 205.

Habitat in locis paludosis totius fere Provinciae. Fl. junio.

457. JUNCUS *trifidus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 208.

*J. monanthos*. Jacq. Obs. N. 33. T. 4. f. 1.

Inveni in editioribus *Larii lacus* et *Vallis Sasina* montibus, *Pizzo di Gino*, *S. Jorio*, *Legnone*, et *Biandino*. Fl. julio, augusto.

458. JUNCUS *articulatus* Willd. spec. pl. T. 2. p. 211.

Abundat in locis humentibus et paludosis. Fl. junio, julio.

439. *JUNCUS subverticillatus Willd. spec. pl. T. 2. p. 212.*

Nascitur in uliginosis Provinciae planioris. Fl. junio, julio.

440. *JUNCUS bufonius Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 214.*

Communis in locis humentibus argillosis. Fl. mayo, junio, julio.

441. *JUNCUS pilosus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 216.*

Haud rarus in sylvis collinis et montanis etiam prope Comum. Fl. primo vere.

442. *JUNCUS maximus Willd. spec. pl. T. 2. p. 217.*

Reperitur in nemoribus, et in pratis montium *Generoso, Gordona, Grigna supra Mandello ec.* Fl. junio, julio.

443. *JUNCUS luteus Willd. spec. pl. T. 2. p. 218. J. campestris e. Linn. spec. pl. 469.*

Mihi occurrit in alpe *Biandino*, et decerpsi florentem augusto.

444. *JUNCUS albidus Willd. spec. pl. T. 2. p. 219.*  
Habitat in sylvis montanis, et fl. junio, julio.

445. *JUNCUS niveus Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 220.*

Oritur in sylvis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. junio, julio.

446. *JUNCUS campestris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 221.*

Obviam mihi venit variis in locis planioris Provinciae, et etiam in pascuis collinis atque montanis. Fl. april, mayo, junio.

447. *JUNCUS Jacquini* Linn. *Mant. Willd. spec. pl.*  
*T. 2. p. 215.*

*J. nigricans* Lamarck. *Encyclop. 3. p. 260.*

Vidi et legi in uliginosis montium *Legnone*, et *Bianchino*, atque in sylvis umbrosis supra *Croce* in *Valle di Menaggio*. Fl. junio, julio, agosto.

448. *BERBERIS vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 227.*

Crescit copiose in sepibus et dumetis circa *Comum*, atque in ericetis collinis montanisque totius fere *Provinciae*. Fl. majo, junio.

449. *PEPLIS Portula* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 243.*

Habitat in locis palustribus, atque in aquis lente fluentibus, prope *Comum*, a *Colico*, et *Porlezza*. Fl. junio, julio.

### TRIGYNIA.

450. *RUMEX crispus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 251.*

Abundat in pratis humidis praesertim humilioris *Provinciae*. Fl. totâ fere aestate.

451. *RUMEX acutus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 1. p. 255.*

Frequens est in pratis humentibus, atque in fossis ubique. Fl. aprili, majo.

452. *RUMEX obtusifolius* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 254.*

Communis in pratis, atque ad margines agrorum plaustris *Provinciae*. Fl. majo, junio.

453. RUMEX *pulcher* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 1. p. 254.

Provenit sat copiose ad vias, ad margines agrorum  
circa Comum, atque in hortorum areis. Fl. majo,  
junio.

454. RUMEX *Hydrolapathum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd.* T. 2. p. 251.

Haud rarus est in pratis irriguis, in locis paludosis,  
et in fossis praesertim circa Comum, et pagum  
*di Asso*. Fl. majo, junio.

455. RUMEX *scutatus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 257.

Reperitur in locis umbrosis vdis omnium fere montium  
Provinciae, atque ad oras lacus Larii inter saxa.  
Fl. majo, junio, julio.

456. RUMEX *alpinus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 259.

Occurrit in pratis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavar-*  
*gna*, *Sasina*, *Dongo*, prope casas pastorum, atque  
bovilia. Fl. junio, julio, augusto.

457. RUMEX *Acetosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2.  
p. 260.

Nascitur copiose in pratis tam montanis, quam hu-  
milioris Provinciae. Fl. totâ aestate.

458. RUMEX *Acetosella* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 260.

Vulgaris est in locis arenosis, atque in pratis siccis  
ubique. Fl. majo, junio, julio.

459. TRIGLOCHIN *palustre* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd.* T. 2. p. 264.

Mihi obviam venit in pratis humentibus *dell'Acqua*  
*negra* prope Comum. Fl. julio, augusto.

460. COLCHICUM *autumnale* Linn. *spec. pl. ed.*  
Willd. T. 2. p. 272.

γ. C. *vernum* Bauh. *pin.*

Oritur in pratis succulentis collinis et montanis totius  
Provinciae. Fl. septembri, octobri. Varietatem re-  
peri in monte *di Griante* florentem aprili.

461. TOFIELDIA *calyculata* Wahlenberg. *Plant.*  
*Helv.* p. 68. N. 590.

T. *palustris* Willd. *enum.* p. 402.

Crescit in pascuis humidis montium Larii lacus et  
Vallis *Sasina*, atque reperitur in pratis udis, quae  
sunt in vallecula suburbii *di S. Martino* Lanificio  
propiora. Fl. junio, julio, augusto.

#### POLYGYNIA.

462. ALISMA *Plantago* Linn. *spec. pl. ed.* Willd.  
T. 2. p. 276.

Habitat in fossis, atque in locis aquosis ubique. Fl.  
aestate.

463. ALISMA *ranunculoides* Linn. *spec. pl. ed.*  
Willd. T. 2. p. 279.

Crescit in fossis, atque in palustribus a *Colico*, et  
circa pagum *di Erba*. Fl. julio, augusto.

## CL. VII. HEPTANDRIA.

## MONOGYNIA.

464. **AESCULUS** *Hippocastanum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 285.

Arbor exotica nostro clymate optime vivit, et colitur in hortis, atque in ambulacris. Fl. majo, junio.

## CL. VIII. OCTANDRIA.

## MONOGYNIA.

465. **OENOTHERA** *biennis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 506.

Species ista Virginiae indigena nunc sponte crescit in variis Provinciae locis ad oras fluminum ac rivorum, et abundat ad ripas fluvii *Lambro* prope *Erba*. Fl. julio.

466. **EPILOBIUM** *angustifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 515.

β. *E. latifolium* Schmidt. bohem. n. 572.

Haud infrequens est species et varietas in sylvis, atque ad pratorum margines montium Vallis *Intelvi*, *S. Primo*, *Boletto* &c. Fl. julio, agosto.

467. **EPILOBIUM** *angustissimum* Willd. spec. pl. T. 2. p. 515.

*E. angustifolium* γ. Linn. spec. pl. 494.

Invenitur in torrentium alycis tam in collibus quam in montibus. Vulgatissimum a *Griante*, *Canzo*, *Asso*, *Lezza*, *Lecco* &c. Fl. julio, agosto.

468. *EPILOBIUM pubescens* Willd. *spec. pl. T. 2. p. 515.*  
*E. hirsutum*  $\beta$ . Linn. *spec. pl. 494.*  
 Commune in fossis, atque locis humentibus planioris  
 Provinciae. Fl. julio, agosto.
469. *EPILOBIUM hirsutum* Willd. *spec. pl. T. 2.*  
*p. 515.*  
 Habitat in locis humidis, et in fossis totius fere Pro-  
 vinciae. Fl. julio, agosto.
470. *EPILOBIUM montanum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 516.*  
 7. *Chamaenerion roseum* cc. Schreb. *Spicil. 147.*  
 Incolit cum varietate 7. locos umbrosos montium et sylvas  
 praesertim in Valle *Intelvi*. Fl. junio, julio, agosto.
471. *CHLORA perfoliata* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 540.*  
 Haud rara in fossis, atque in pratis udis tam collium  
 quam planitiei. Fl. majo, junio, julio.
472. *VACCINIUM Myrtillus* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 548.*  
 Vulgare in sylvis montium totius Provinciae. Fl. majo,  
 junio.
473. *VACCINIUM uliginosum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 550.*  
 Mihi obviam venit in locis humidis montis *Legnone* a  
 regione *Abietis* usque ad illam *Mughi*. Fl. junio, julio.
474. *VACCINIUM Vitis idaea* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 554.*  
 Occurrit mihi in montibus *Larii* lacus, *Vallis Cavar-*  
*gna*, atque in sylvis a *Cremia*, *Pianello*, *Dongo*.  
 Fl. julio, agosto.
475. *ERICA arborea* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2.*  
*p. 566.*



Reperitur inter saxa ad radices montium, atque in sylvis Larii lacus multis in locis, et praesertim circa pagos di *Argegno*, *Rezzonico*, *Dervio*, *Corenno*, et *Piona* prope *Colico*. Fl. martio, aprili, majo.

476. *ERICA vulgaris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 575.

Vulgatissima est in sylvis, atque in locis sterilibus incultis montium collium et planitiei. Fl. augusto, septembri.

477. *ERICA herbacea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 411.

β. *E. carnea* Linn. spec. pl. p. 504. Willd. T. 2. p. 412.

Haec species cum varietate frequens est in sylvis montanis et collinis. Fl. prima autumnus, et secunda hyeme, atque vere.

478. *DAPHNE Mezereum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 415.

Nascitur in sylvis montium etiam Como viciniorum, et abundat in Valle *Intelvi*. Fl. martio, aprili, majo.

479. *DAPHNE Laureola* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 418.

Habitat cum praecedente in sylvis montanis prope *Commum*, atque in montibus Larii lacus, Vallis *Intelvi* cc. Fl. martio, aprili, majo.

480. *DAPHNE Cneorum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 422.

Habitat in montibus *Legnone*, *Codeno*, *Pizzo di Gino*, *Bellorona*. Inveni etiam in monte di *Griante* regionem collinam vix superante. Fl. majo, junio, julio.

## TRIGYNIA.

481. MOEHRINGIA *muscosa* Willd. *spec. pl. T. 5.*  
*p. 459.*  
 Reperi in montibus Vallium *Cavargna* et *Sasina*,  
 atque in *Valmeria* supra *Mandello* ad scaturigines  
 rivulosque. Fl. julio, agosto.
482. POLYGONUM *Bistorta* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 441.*  
 Provenit in pratis montium totius fere Provinciae.  
 Fl. junio, julio.
485. POLYGONUM *viviparum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 441.*  
 Legi in montibus *Legnone* et *Codeno*, ubi adscendit  
 usque ad regionem subnivosam. Fl. junio, julio,  
 agosto.
484. POLYGONUM *amphibium* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 445.*  
 Crescit in locis palustribus circa lacusculos *del Se-*  
*grino*, *d'Alserio*, *Porlezza*, *Varese*, atque in aquis  
 lente fluentibus prope *Comum*. Fl. junio, julio,  
 agosto.
485. POLYGONUM *Hydropiper* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 444.*  
 Invenitur in fossis, atque in pratis udis totius fere  
 Provinciae. Fl. julio, agosto.
486. POLYGONUM *Persicaria* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 446.*  
 Habitat in pratis atque locis humidis, et fl. julio,  
 agosto.
487. POLYGONUM *Lapathifolium* Linn. *spec. pl.*  
*ed. Willd. T. 2. p. 442.*

Occurrit iisdem in locis ac praecedens, et fl. eodem tempore.

488. POLYGONUM *aviculare* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 449.

Abundat ad vias, in ruderatis, atque in arcis hortorum. Fl. junio, julio, agosto.

489. POLYGONUM *Convolvulus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 455.

Oritur ad sepes, atque in dumetis praesertim planioris Provinciae. Fl. julio, agosto.

#### TETRAGYNIA.

490. PARIS *quadrifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 471.

Mihi obviam venit in montibus di *Ponzate, Bisbino, Canzo, Vallis Intelvi. ec.* Fl. majo, junio.

491. ADOXA *Moschatellina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 472.

Reperi in sylvis umbrosis di *S. Fedele* in Valle *Intelvi* prope *Orimento*. Fl. junio, julio.

## CL. IX. ENNEANDRIA.

#### MONOGYNIA.

492. LAURUS *nobilis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 479.

Communis est ad oras *Latii lacus*. Fl. aprili, majo.

## CL. X. DECANDRIA

## MONOGYNIA.

495. **CERCIS** *Siliquastrum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 507.

Nascitur in sylvis et dumetis ad radices montium della *Tremezzina*, et abundat praesertim in sepibus prope pagos di *Bonzanigo*, et *Viano*. Fl. majo, junio.

494. **DICTAMNUS** *albus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 541.

Reperitur in monte urbi propiore Orientem spectante supra *S. Agostino*, a *Carascione*, atque nelle *Gros-galle* inter *Lezzeno* et *Bellagio*. Fl. majo, junio.

495. **RUTA** *graveolens* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 542.

Crescit inter saxa a *Geno*, *Pizzo*, atque in dumetis supra *Bonzanigo* in *Tremezzina*. Fl. majo, junio, julio.

496. **TRIBULUS** *terrestris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 567.

Oritur in agris siccis, atque in locis incultis aridis Provinciae meridionalis. Fl. junio, julio.

497. **RHODODENDRON** *ferrugineum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 605.

Frequens est in montibus *Larii* lacus, atque in illis *Como* vicinioribus a limite *Fagi* usque ad terminum *Abietis*. Ego inveni etiam ad radicem montis *delle tre Croci* prope *Lora* in regione collina. Fl. junio, julio, agosto.

498. RHODODENDRON *hirsutum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 604.*

Hæc species abundat in montibus *di Mandello*, *Vallis Savina*, *Canzo*, &c. inter Fagi atque Abietis regiones. Fl. junio, julio, augusto.

499. ARBUTUS *alpina* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 618.*

Mihi occurrit in monte *Legnone*, inter regiones alpinam inferiorem et subnivosam. Fl. junio, julio.

500. ARBUTUS *Uva ursi* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 618.*

Habitat in montibus *di Griante*, et *Falsolda* in locis inter Fagi et Abietis regiones positis. Fl. junio, julio.

501. PYROLA *rotundifolia* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 621.*

Mihi obviam venit in montibus *di Canzo* et *Ponzate* ad cacumen *Boletto* vocatum. Fl. junio, julio.

502. PYROLA *uniflora* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 622.*

Reperi in sylvis laricinis et abietinis montium *Legnone*, *Livo*, et *Vallis Cavargna*. Fl. julio.

#### DIGYNIA.

505. CHRYSOSPLENIUM *alternifolium* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 657.*

Nascitur abunde in sylvis secus rivos, et in locis umbrosis humentibus tam planitieci quam montium totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

504. SAXIFRAGA *Cotyledon* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 638.

*S. pyramidalis* Lapeyrouse Fl. pyren. p. 52. Decand. Fl. fr. T. 4. p. 560.

Provenit copiose in monte *Legnone*, a quo descendit usque ad oras Iarii lacus prope *Dervio*, et *Dorio*. Reperi etiam in montibus Vallis *Sasina*. Fl. junio, julio.

505. SAXIFRAGA *Aizoon* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 659.

Communis est ad rupes montis, qui est ad occidentem urbis, supra *S. Abbondio*, prope *S. Carposoro*, atque *al Ponte Molinello*. Fl. junio, julio.

506. SAXIFRAGA *mutata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 640.

Legi in montibus *Codeno* supra *Mantello*, et *Resegone* supra *Lecco* inter regiones *Abietis* et *Mugli*. Fl. julio, agosto.

507. SAXIFRAGA *androsacea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 641.

Mibi occurrit in monte *Legnone* ad rupes prope *la Porta dei Merli*, qui locus parum a cacumine distat, et decerpsi florentem julio, et augusti initio.

508. SAXIFRAGA *coesia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 641.

Abundat ad cacumen montis *Canzo* inter saxa. Fl. julio, agosto.

509. SAXIFRAGA *bryoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 645.

Inveni in monte *Legnone* ad rupes supra *Abietis* regionem. Fl. julio, agosto.

510. SAXIFRAGA *stellaris*. *Linn. spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 644.*

Vidi magnâ copâ in locis humentibus montium Vallis  
*Sasina*, et præsertim in alpe *Biandino* secus riu-  
 los. Numquam reperi infra regionem Fagi. Fl. julio,  
 agosto.

511. SAXIFRAGA *cuneifolia* *Linn. spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 647.*

Mihi obviam venit in sylvis atque locis umbrosis mon-  
 tium *Generoso*, *Pizzo di Gino*, *Bellorona*, et *Le-  
 gnone* in quibus ultra limitem Abietis non ascendit.  
 Fl. junio, julio.

512. SAXIFRAGA *oppositifolia* *Linn. spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 548.*

Habitat in summitate montis *Generoso* ad rupes, et  
 provenit etiam in aliis Provinciæ montibus regionem  
 subalpinam hand superantibus. Fl. junio, julio.

513. SAXIFRAGA *aspera* *Linn. spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 649.*

Crescit in locis saxosis irrigatis montium *Legnone*,  
*Pizzo di Gino*, *Aigua*, *Bellorona*, et *Biandino*  
 supra terminum Fagi. Fl. junio, julio.

514. SAXIFRAGA *Aizooïdes* *Sternberg. Rev. Saxifr.*  
*p. 25. tab. 8. fig. 1.*

*S. Aizooïdes* *Linn. spec. pl. 576. Willd. spec. T. 2.*  
*p. 650.*

*S. autumnalis* *Linn. spec. pl. 575. Willd. spec.*  
*T. 2. p. 650.*

Reperitur copiose ad rivulos montium *di Dongo*, *Le-  
 gnone*, *Coleno* ec. a regione subalpina descendens  
 usque ad illam Juglandis. Fl. agosto, septembri.

515. *SAXIFRAGA rotundifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 651.

Haec species est vulgatissima in locis umbrosis atque humentibus montium Larii lacus, et Vallis Intelvi. Fl. junio, julio.

516. *SAXIFRAGA bulbifera* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 651.

Nascitur ad rupes al Ponte Molinello prope Comum. Fl. junio julio.

517. *SAXIFRAGA Tridactylites* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 654.

Frequens est ad muros propugnaculorum urbis, atque in alveo torrentis Cosia. Fl. primo vere.

518. *SAXIFRAGA petraea* Linn. spec. pl. T. 1. p. 578. (exclusis synonymis)

*S. rupestris* Willd. spec. pl. T. 2. p. 655.

*S. Ponae* Sternb. Rev. Saxifr. p. 47. T. 11. f. 6.

Haec species oritur inter saxa al Buco del Piombo supra Erba, quo in loco solummodo vidi, et legi florentem junio.

519. *SAXIFRAGA muscoides*, fol. radicalibus conglomeratis tripartitis linearibusque glabris; floribus patulis, petalis lanceolatis calyce longioribus. Wahlenb. p. helv. p. 80.

β. *S. moschata* Willd. spec. pl. T. 2. p. 656.

Species cum varietate incolit montes editiores Larii lacus, Legnone, Codeno, Pizzo di Gino ec. ad rupes. An species distinctae considerandae? Fl. julio, agosto.

520. *SAXIFRAGA Vandellii* Sternberg. Rev. Saxifr.

Reperi solummodo in cacumine montis Canzo ad rupes. Fl. julio.



521. *SCLERANTHUS annuus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 660.

Frequens in arvis aridis collium et planitiei. Fl. junio, julio.

522. *SCLERANTHUS perennis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2. p. 661.

Observavi in agris collium et montium prope Comum, a *Respau*, atque in herbidis juxta *la Croce di S. Faticchio*. Fl. junio, julio.

523. *GYPSOPHILA repens* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 662.

Inveni ad rupes in montibus *Legnone et Pizzo di Gino* supra terminum Fagi, et legi etiam in saxosis *della Fulmeria* supra *Mandello*. Fl. julio, agosto.

524. *GYPSOPHILA muralis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 666.

Abundat ad margines agrorum sterilium, atque ad vias. Fl. julio, agosto, septembri.

525. *GYPSOPHILA Saxifraga* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2. p. 666.

Vulgaris ad muros, atque in locis aridis sterilibus ubique. Fl. majo, junio, julio, agosto.

526. *SAPONARIA officinalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2. p. 667.

Occurrit copiose in locis humidis umbrosis planioris Provinciae, secus rivos atque torrentes etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

527. *SAPONARIA Vaccaria* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 668.

Invenitur in campis planioris Provinciae inter segetes. Fl. majo, junio.

528. SAPONARIA *Ocymoides* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 669.

Crescit magnâ copiâ in collibus atque in montibus  
Comi, *Vill' Albese*, *Erba* cc. Fl. aprili, majo,  
junio.

529. DIANTHUS *carthusianorum* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 671.

Communis est in collibus atque montibus. Fl. junio,  
julio.

530. DIANTHUS *atrorubens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 672.

Vidi ad radices montium *della Tremezzina*, atque in  
herbosis aridis circa pagum *di Bellano*. Fl. majo,  
junio.

531. DIANTHUS *prolifer* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 675.

Occurrit in pratis aridis atque locis glareosis planioris  
Provinciae. Fl. junio, julio.

532. DIANTHUS *Caryophyllus* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 674.

Vulgatissimus est in locis collinis, atque in sylvis apri-  
cis superioris Provinciae. Fl. junio, julio.

533. DIANTHUS *sylvestris* Willd. spec. pl. T. 2.  
p. 675.

Legi in montibus *Vallis Sasina* florentem julio exeunte.

534. DIANTHUS *plumarius* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 677.

Mihi obviam venit in montibus *Vallis Intelvi* humi-  
lioribus circa *Laino* et *S. Fedele*. Rarus est in mon-  
tanis et collinis locis prope *Comum*. Fl. junio,  
julio.

555. *DIANTHUS superbus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 679.

Reperitur copiose in pratis Vallis *Intelvi*, atque in sylvis di *Laino*, *Pellio*, et etiam in locis herbidis humidiusculis in vallecula di *S. Martino* prope Comum. Fl. julio, agosto.

## TRIGYNIA.

556. *CUCUBALUS Behen* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 684.

Nihil vulgatius in pratis, atque ad margines agrorum herbidos collium, montium, et planities. Fl. majo, junio.

557. *CUCUBALUS italicus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 686.

Communis est in declivitatibus herbidis collium circa Comum. Fl. majo, junio.

558. *CUCUBALUS Otites* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 688.

Habitat in sylvis collium et montium Como viciniorum. Fl. majo, junio.

559. *SILENE nutans* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 694.

Provenit ad margines agrorum in collibus, atque in montibus totius fere Provinciae. Fl. majo, junio.

540. *SILENE baccifera* Willd. spec. pl. T. 2. p. 700.

Nascitur in sepibus circa Comum. Fl. majo, junio.

541. *SILENE gallica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 695.

Inveni prope pagum di *Lucino* in arvis collinis, atque a *Carlano* prope Comum. Fl. junio.

542. *SILENE Armeria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 705.  
Crescit magnâ copiâ ad margines agrorum herbidos  
collium et montium circa Comum. Fl. majo, junio.
543. *SILENE rupestris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 707.  
Species haud rara in montibus fere omnibus Larii  
lacus. Fl. junio, julio.
544. *SILENE Saxifraga* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 708.  
Abundat in locis apricis collium et montium. Fl. majo,  
junio, julio.
545. *SILENE acaulis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 709.  
Incolit montes editiores Provinciae, uti *Legnone*, *Co-*  
*deno*, *Pizzo di Gino*, ec. in pratis terminum Abietis  
superantibus. Fl. junio, julio, agosto.
546. *STELLARIA nemorum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 710.  
Reperitur ubique in sylvis, atque in sepibus. Fl. majo,  
junio, julio.
547. *STELLARIA Holostea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 711.  
Communis in sepibus atque nemoribus praesertim  
collinis. Fl. majo, junio, julio.
548. *STELLARIA graminea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 711.  
Oritur in pratis, sylvis, atque sepibus montium, in  
Valle *Intelvi* praesertim. Fl. junio, julio.
549. *STELLARIA Alsine* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 715.

Reperitur haud rara secus rivulos in collibus atque montibus. Fl. junio, julio.

550. *ARENARIA biflora* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 717.

Reperi in montibus editioribus Vallis Cavargna, Pizzo di Gino, Costa piatta, Bellorona, Tabano supra terminum Abietis. Fl. junio, julio, augusto.

551. *ARENARIA ciliata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 718.

Habitat in montibus editis Larii lacus, Legnone, Codeno, S. Jorio, inter Abietis et Mughi regiones. Fl. julio, augusto.

552. *ARENARIA serpillifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 720.

Vulgaris est in hortis, atque in locis sterilibus praesertim planioris Provinciae. Fl. aprili, majo.

553. *ARENARIA laricifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 726.

Mihi occurrit in montibus Vallis Cavargna, Legnone, atque in alpe Arengo supra Livo. Nunquam inveni in locis regioni subalpinæ inferioribus. Fl. junio, julio.

554. *ARENARIA recurva* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 726.

Habitat cum praecedente, et fl. eodem tempore.

555. *ARENARIA saxatilis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 724.

Inveni in montibus Vallis Cavargna, Pizzo di Gino, Garzola inter saxa. Fl. junio, julio.

556. *CHELERIA sedoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 750.

Legi ad cacumina montium Legnone, et Codeno. Fl. julio, augusto.

## PENTAGYNIA.

557. SEDUM *Rhodiola* Willd. enum. p. 485.  
*Rhodiola rosea* Linn. spec. pl. T. 2. p. 1465.  
 Inveni in summis jugis montium *di Livo* et praesertim inter rupium fissuras alpibus *d' Arengo*. Fl. julio, agosto.
558. SEDUM *Telephium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 761.  
 Nascitur in locis aridis *della Brianza*, atque ad rupes collium Como viciniorum. Fl. julio, agosto.
559. SEDUM *maximum* Krocher. Hoffm. Fl. germ. p. 156.  
 Frequens in rupibus a *Geno* ec. Fl. junio.
560. SEDUM *Cepaea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 765.  
 $\beta$ . *S. galioides* Allion. Fl. ped. T. 2. p. 120.  
*S. spathulatum* Kittaibel.  
 Abundat species cum var. in locis umbrosis, et in sepibus circa *Comum*, atque ad muros prope pagum *Vill' Albese*, et alibi. Fl. junio, julio.
561. SEDUM *dasyphyllum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 765.  
 Frequens est ad parietes in hortis, atque in locis aridis sterilibus inter saxa. Fl. junio, julio.
562. SEDUM *reflexum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 764.  
 Oritur in locis siccis collium Como viciniorum, et praesertim ad rupes supra *S. Giovanni Pedemonte*, atque *al Ponte Molinello*. Fl. junio, julio.
563. SEDUM *saxatile* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 765.

Mili obviam venit in monte *Biandino* ad rupes. Fl. julio, agosto.

564. *SEDUM album* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 766.

Commune in muris vetustis, atque in locis petrosis. Fl. junio, julio.

565. *SEDUM acre* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 767.

Occurrit in locis aridis saxosis montium et collium etiam prope Comum. Fl. junio, julio.

566. *OXALIS Acetosella* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 780.

Reperitur magnâ copiâ in sylvis umbrosis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

567. *OXALIS corniculata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 800.

Abundat juxta sepes, atque in locis aridis collium ad margines agrorum. Fl. aprili, majo, junio.

568. *AGROSTEMMA Githago* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 805.

Crescit inter segetes in campis collinis et planis. Fl. majo, junio.

569. *AGROSTEMMA Flos jovis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 806.

Habitat in pratis montium *Generoso*, et *Boletto* supra *Ponzate*. Fl. majo, junio.

570. *LYCHNIS Flos Cuculi* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 807.

Nihil vulgatius in pratis tam collium quam planitiei. Fl. majo, junio.

571. *LYCHNIS Viscaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 808.

Oritur copiose ad margines agrorum herbidos in collibus praesertim prope Comum, *alla Camerlata*, ad arcem *Baradello*, *ec. ec.* Fl. junio.

572. LYCHNIS *alpina* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 809.

Inveni fere ad summitatem montis *Codeno* ex parte, quae spectat pascua montana *di Mandello*, et legi florentem initio augusti.

573. LYCHNIS *dioica* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2.  
p. 810.

Frequens in pratis collinis, juxta sepes, ad vias, atque in sylvis. Fl. majo, junio, julio, agosto.

574. CERASTIUM *vulgatum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 811.

Provenit in areis hortorum, in pascuis, atque ad margines agrorum ubique. Fl. aprili, majo, junio.

575. CERASTIUM *viscosum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 812.

Nascitur in locis aridis, atque in pratis. Fl. aprili, majo, junio.

576. CERASTIUM *semidecandrum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 2. p. 812.

Habitat in arvis sterilibus et arenosis collium circa Comum. Fl. majo, junio.

577. CERASTIUM *arvense* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 813.

Reperitur ad margines agrorum collium, atque in pratis montanis *Vallis Intelvi*, *Ponzate*, *Brunate*, *ec.* Fl. majo, junio.

578. CERASTIUM *aquaticum* Willd. *spec. pl.* T. 2.  
p. 816.



Occurrit in pratis humentibus, atque in fossis præsertim planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

579. CERASTIUM *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 814.

Legi in pascuis montis *Biandino*, atque in pratis *della Valmeria* supra *Mandello* in regione alpina inferiore. Fl. julio, agosto.

580. CERASTIUM *repens* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 815.

Observavi ad radices montium prope *Comum*, *al Ponte Molinello*, ad arcem *Baradello*, atque in sylvis circa *Carlano*. Fl. junio, julio.

581. CERASTIUM *manticum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 818.

Oritur in sylvis, atque etiam in arvis circa pagos *di Cermenate*, *Lomazzo* &c. Fl. majo, junio, julio.

582. SPERGULA *arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 818.

Vulgaris in arvis collinis et montanis inter segetes, etiam a *Garzola*, *Civiglio*, *Solzago*, *Cannago*, prope *Comum*. Fl. aprili, majo, junio, julio.

585. SPERGULA *saginoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 820.

Mihi obviam venit in pratis montis *Legnone* regioni *Abietis* superioribus, et legi florentem julio.

#### DECAGYNIA.

584. PHYTOLACCA *decandra* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 822.

Crescit copiose circa *Comum* in locis umbrosis, in sepibus, atque in ruderatis; nascitur etiam in aliis Provinciae partibus. Fl. totâ aestate.

## CL. XI. DODECANDRIA.

## MONOGYNIA.

585. **A**SARUM *europaeum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 858.

Habitat in sylvis umbrosis montium et collium, *Boletto* supra *Ponzate*, in *Valle Intelvi*, atque a *Lucino* loco dicto *ai Dossi* secus torrentem. Fl. majo, junio.

586. **P**ORTULACA *oleracea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 859.

Haud infrequens in hortis, atque in locis cultis. Fl. julio, agosto.

587. **L**YTHRUM *Salicaria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 865.

Nascitur in fossis, atque secus aquas lente fluentes, et etiam in pratis humentibus a *S. Giuseppe* in *Valleggio* prope *Comum*. Fl. junio, julio.

588. **L**YTHRUM *virgatum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 865.

Vigili in pratis humentibus montanis, *Vallis Intelvi*, et *Bellagio*. Fl. junio, julio.

## DIGYNIA.

589. **A**GRIMONIA *Eupatoria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 875.

Occurrit sat frequenter juxta sepes, atque in locis incultis umbrosis. Copiosa est in vallecula *dei Molini* prope *Suburbium di S. Martino*. Fl. junio, julio.

## TRIGYNIA.

590. RESEDA *lutea* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 879.*

Observavi ad margines agrorum circa pagum di *Civiglio* in terris cretaceis. Fl. totà aestate.

591. EUPHORBIA *Peplus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 905.*

Communis est in hortis, atque in agris ubique. Fl. junio, julio.

592. EUPHORBIA *falcata* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 903.*

Oritur inter segetes in arvis praesertim collinis circa *Comum, Erba*, atque alios pagos *della Brianza*. Fl. junio, julio.

593. EUPHORBIA *Lathyris* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 906.*

Crescit in hortis, atque ad sepes collium circa *Comum*, et in arvis prope *Farenna*. Fl. majo, junio, julio.

594. EUPHORBIA *helioscopia* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 914.*

Reperitur in hortis, atque in locis cultis ubique. Fl. totà aestate.

595. EUPHORBIA *verrucosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 919.*

Nascitur in sylvis, atque in pascuis humentibus montium et collium circa *Comum, a Blevio*, atque a *S. Maurizio* supra *Brunate*. Fl. majo, junio.

596. EUPHORBIA *Cyparissias* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 920.*

Abundat in locis sterilibus collinis circa Comum, atque in *Tremezzina* Fl. aprili, majo, junio, julio.

597. EUPHORBIA *amygdaloides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 924.

Frequens est in sylvis collinis et montanis totius fere Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

598. EUPHORBIA *sylvatica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 925.

Haud rara est in sylvis, quae sunt oris Larii lacus propiores praesertim circa *Moltrasio*, et *Urio*. Fl. majo, junio, julio.

#### DODECAGYNIA.

599. SEMPERVIVUM *tectorum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 952.

Occurrit ad rupes collium prope Comum a *Geno*, in *Valgiojera*, atque inter saxa ad oras Larii lacus circa pagos di *Mandello*, *Varenna*, *Dervio* ec. Fl. junio, julio.

600. SEMPERVIVUM *globiferum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 952.

Inveni in arvis herbidis siccis prope pagum *Sueglio* supra *Dervio*. Fl. julio, agosto.

601. SEMPERVIVUM *arachnoideum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 953.

Observavi in pascuis aridis et saxosis montium Vallis *Cavagna*, *Pizzo di Gino*, *Garzirola* inter *Abietis* et *Mugli* regiones. Fl. julio, agosto.

602. SEMPERVIVUM *montanum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 954.

Mihi obviam venit in montibus *Codeno*, *Resegone*, et *Biandino*. Fl. julio, agosto.

## CL. XII. ICOSANDRIA.

## MONOGYNIA.

605. **P**HILADELPHUS *coronarius* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 917.

Haud rarus est in sepibus montanis et collinis circa Commun a S. Abbondio, Blesio, Brunate, Lucino, atque in Brianza. Fl. majo, junio, julio.

604. MYRTUS *communis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 967.

Reperitur fere ad oras Larii lacus a Briennio prope finem della Madonna, supra Argegno, atque inter Bellano et Dervio. Fl. junio, julio.

605. PUNICA *Granatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 981.

Provenit ad rupes arcis Barulello, ad oram lacus a Geno, et copiose in sepibus della Tremezzina. Fl. junio, julio.

606. AMYGDALUS *Persica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 982.

Colitur in hortis, in vineis, atque in agris collinis et planis totius Provinciae. Fl. martio, aprili.

607. AMYGDALUS *communis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 982.

Colitur in hortis, atque in collibus della Brianza praesertim a Lezza, et Suello. Fl. martio, aprili.

608. PRUNUS *Padus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 984.

Abundat in sylvis collinis pagorum Como viciniorum,  
*a Lucino, Breccia, Montano, Maccio* ec. Fl. aprili,  
 maio.

609. PRUNUS *Lauro-Cerasus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 988.

Hæc species ex Trapezunte in Europam allata observatur culta in hortis variis in Provinciae locis. Fl. aprili, maio.

610. PRUNUS *Mahaleb* Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 2. p. 988.

Crescit abunde in sepibus circa pagos *di Argegno, Colonno, Sala*, et provenit etiam in aliis Provinciae locis. Fl. maio, junio.

611. PRUNUS *Armeniaca* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 989.

Colitur in hortis. Fl. aprili.

612. PRUNUS *Cerasus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 991.

α. *Cerasus caproniana*.

β. *Cerasus rosea*.

δ. *Cerasus dulcis*.

ε. *Cerasus juliana*.

η. *Cerasus austera*.

ι. *Cerasus avium*.

Hæc species cum varietatibus colitur in hortis, atque in prædiis collium, et planities. Fl. aprili.

613. PRUNUS *avium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 991.

*Cerasus silvestris fructu nigro et rubro* Bauh. hist. 1. p. 220.

Hæc species sponte provenit in sylvis collinis et montanis, et colitur etiam in prædiis. Fl. aprili.

614. PRUNUS *domestica* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 995.

Plures hujus speciei varietates coluntur in hortiis. Fl. aprili.

615. PRUNUS *spinosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 997.

Frequens est in sepibus atque dumetis. Fl. aprili.

DIGYNIA.

616. CRATAEGUS *monogyna* Willd. *spec. pl. T. 2.*  
p. 1006.

Communis est in sepibus totius fere Provinciae. Fl. aprili, majore.

TRIGYNIA.

617. SORBUS *aucuparia* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 1008.

Abundat in sylvis montanis Larii lacus, Vallis *Intelvi* ec. Fl. junio, julio.

PENTAGYNIA.

618. MESPILUS *germanica* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 1010.

Occurrit in sepibus collinis circa Comum, et etiam in Valle *Intelvi*, atque in aliis locis Larii lacus. Fl. majore, junio.

619. MESPILUS *Cotoneaster* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1012.*

- Habitat in montibus *di S. Abbondio* prope Comum ,  
*della Tremezzina*, *di Griaute* ec. Fl. majo, junio.
620. PYRUS *Amelanchier* Willd. spec. pl. T. 2.  
 p. 1014.
- Obviam venit in montibus circa Comum. Fl. aprili.
621. PYRUS *communis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
 T. 2. p. 1016.
- Plures hujus speciei varietates excoluntur in hortis.  
 Fl. aprili.
622. PYRUS *Malus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2.  
 p. 1017.
- Creseit haec species sponte in sylvis montanis Vallis  
*Intelvi*, *Ponzate*, *Brunate* ec. Plurimae varietates  
 sunt in hortis, atque praediis. Fl. in planitie et  
 collibus aprili, in montibus vero majo, junio.
625. PYRUS *Aria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2.  
 p. 1021.
- Incolit montes fere omnes Provinciae, et fl. junio,  
 julio.
624. PYRUS *torminalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
 T. 2. p. 1021.
- Reperitur in montibus *di Garzeno*, *Stazzona*, et  
*Dosso Liro* supra pagos *di Dongo* et *Gravedona*.  
 Fl. junio, julio.
625. SPIRAEA *Aruncus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
 T. 2. p. 1060.
- Vulgaris est in sylvis collium et montium Como vi-  
 ciniorum, *S. Abbondio*, *S. Maurizio*, *Blerio*, at-  
 que ad rivos in Valle *Intelvi* ec. Fl. junio, julio.
626. SPIRAEA *Filipendula* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
 T. 2. p. 1061.



Haud rara est in collibus, atque montibus prope Commum. Fl. majo, junio, julio.

627. SPIRAEA *Ulmaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1061.

Invenitur in fossis, atque in pratis udis planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

POLYGYNIA.

628. ROSA *cinnamomea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1065.

Haud infrequens est in sylvis occurrentibus in via, quae ducit a *Brunate*, atque in collibus supra *Erba*. Fl. majo.

629. ROSA *arvensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1066.

Vidi in sylvis collinis di *Vill'Albese* et *Erba*. Fl. majo, junio.

630. ROSA *centifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1071.

Colitur in hortis, et fl. majo, junio.

631. ROSA *gallica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1071.

Excolitur in hortis, ubi floret majo, junio.

632. ROSA *rubrifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1175.

Reperi in montibus *Como* vicinioribus. Fl. junio.

633. ROSA *alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1075.

Crescit in montibus *Larii* lacus, atque in sylvis a *S. Maurizio* supra *Brunate*. Fl. junio, julio.

654. ROSA *canina* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2.*  
*p. 1077.*

Occurrit ubique in sepibus, et dumetis. Fl. majo, junio.

655. ROSA *alba* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2.*  
*p. 1080.*

Invenitur in sepibus collinis. Varietas flore pleno colitur in hortis. Fl. majo, junio.

656. ROSA *villosa* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2.*  
*p. 1069.*

Provenit in sylvis montis di *S. Abbondio* prope Comum. Fl. majo, junio.

657. RUBUS *idaeus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2.*  
*p. 1081.*

Nascitur in dumetis montium Vallis *Intelvi*, et Larii lacus. Fl. junio, julio.

658. RUBUS *coesius* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2.*  
*p. 1084.*

Frequens est in ruderatis, in dumetis, atque ad margines fossarum totius fere Provinciae. Fl. junio.

659. RUBUS *fruticosus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1084.*

Oritur in sepibus, et in dumetis ubique. Fl. majo, junio, julio.

640. RUBUS *saxatilis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1088.*

Observavi, et legi ad cacumina montium *Canzo*, et *Generoso*, inter saxa. Mihi obviam venit etiam in monte *Legnone* in regione Abietis. Fl. junio, julio.

641. FRAGARIA *vesca* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1090.*

Abundat in collibus atque montibus totius Provinciae.  
Fl. martio, aprili, majo.

642. FRAGARIA *sterilis* Willd. *spec. pl. T. 2.*  
*p. 1095.*

Communis est in collibus et montibus circa Comum,  
etiam ad viam, quâ itur ad *Garzola*, *Civiglio*. Fl.  
martio, aprili.

643. POTENTILLA *Anserina* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 1095.*

Reperitur in locis paludosis a *Colico*, atque in pas-  
cuis humidis planitie, et etiam in urbe ad murum  
in via *Stretta di Porta Nuova* nuncupata. Fl. julio,  
augusto.

644. POTENTILLA *rupestris* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 2. p. 1097.*

Crescit ad rupes montium *Larii* lacus regionem al-  
pinam inferiorem attingentium, et etiam in monte  
*di S. Abbondio* prope Comum terminum collinum  
vix superante. Fl. junio, julio.

645. POTENTILLA *recta* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 1099.*

Occurrit frequenter ad margines agrorum herbidos  
collium circa Comum a *Garzola*, *Cannago*, *Ci-*  
*viglio*, *ec.* Fl. junio, julio.

646. POTENTILLA *argentea* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 1101.*

Habitat in pascuis siccis arenosis planioris Provinciae,  
etiam in ruderatis circa Comum. Fl. majo, junio,  
julio.

647. POTENTILLA *verna* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 2. p. 1104.*

Vulgatissima in sylvis, et pascuis praesertim montanis. Fl. vere, aestate.

648. *POTENTILLA aurea* Willd. spec. pl. T. 2. p. 1105.

Mihi obviam venit in pascuis montium di *Dongo*, *Mandello*, et *Vallis Cavargna*, inter Fagi et Abietis regiones. Fl. junio, julio.

649. *POTENTILLA alba* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1106.

Nascitur in pascuis montium *Larii lacus* regionem Fagi haud superantibus, et reperitur etiam ad summitatem montis *Boletto* supra *Ponzate*. Fl. maio, junio.

650. *POTENTILLA caulescens* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1106.

Haec species, quae ex regione alpina usque ad collinam descendit, provenit magnâ copiâ ad rupes *delle Crosgalle* prope *Bellagio*, *del Sasso Rancio* ec., atque inter saxa montium *Larii lacus* et *Vallium Sasina* ac *Cavargna*. Fl. junio, julio, augusto.

651. *POTENTILLA nitida* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1108.

Oritur inter saxa, atque in pascuis aridis *della Valmeria* supra *Mandello*, et in monte *Codeno* a termino Fagi usque ad *Mughi* regionem. Fl. julio, augusto.

652. *POTENTILLA reptans* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1108.

Abundat in pratis, atque ad agrorum margines ubique. Fl. maio, aestate.

653. *TORMENTILLA erecta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1112.

Frequens est in collibus, montibus, atque etiam in locis aridis planis totius fere Provinciae. Fl. mayo, junio, julio.

654. *GEUM urbanum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1115.

Commune ad sepes ubique. Fl. mayo, junio.

655. *GEUM rivale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1115.

In pascuis collibus et montanis humentibus, atque secus rivulos haud raro occurrit. Fl. mayo, junio, julio.

656. *GEUM montanum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1116.

Invenitur in montibus editioribus Provinciae, et abunde in alpibus *Legnone*, *Codeno*, *Pizzo di Gino* ultra limitem *Laricis* et *Abietis*. Fl. julio, agosto.

657. *DRYAS octopetala* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1118.

Vidi, et legi in montis *Codeno* jugis supra congeriem glaciale, et inter saxa in *Valmeria* supra pagum *Mandello*. Fl. julio, agosto.

658. *COMARUM palustre* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1119.

Reperi in pratis uliginosis *dell'Acqua Negra*, *del Bassone* prope *Comum*, atque in palustribus circa lacusculos *d'Alserio*, *di Pusiano*, *del Piano* prope *Portezza*. Fl. junio, julio.

## CL. XIII. POLYANDRIA.

## MONOGYNIA.

659. **CAPPARIS** *spinosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1150.

Observatur haec species culta ad muros hortorum meridiem spectantes in variis Provinciae locis, praesertim in *Tremezzina*, atque *Brianza*. Fl. junio, julio, agosto.

660. **ACTAEA** *spicata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1159.

Habitat haud rara in sylvis montium Como viciniorum, atque in Valle *Intelvi* circa pagos *di Laino*, et *Pellio inf.* Fl. majo, junio, julio.

661. **CHELIDONIUM** *majus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1141.

Crescit in ruderalis, atque in locis incultis ubique. Fl. aprili, majo.

662. **PAPAVER** *Argemone* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1144.

Nascitur in arvis siccis inter segetes ubique. Fl. aprili, majo.

663. **PAPAVER** *aurantiacum* Dec. Fl. fr. T. 5.  
p. 585.

Reperitur inter saxa ad cacumina montis *Codeno* in regione subnivosa. Fl. julio, agosto.

664. **PAPAVER** *Rhoeas* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1147.

Frequens in agris inter segetes ubique. Fl. aprili, majo, junio.

665. NYMPHAEA *lutea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1151.

Obviam mihi venit in lacubus *del Segrino, di Varese, atque del Piano prope Porlezza*. Fl. junio, julio, agosto.

666. NYMPHAEA *alba* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1152.

Abundat in lacubus *d' Alserio, di Pusiano, del Segrino, di Varese, atque del Piano prope Porlezza*. Fl. junio, julio, agosto.

667. THIA *europaea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1161.

α. *T. grandifolia* Hoffm. germ. 184.

γ. *T. parvifolia* Hoffm. germ. 184.

Crescit utraque varietas in sylvis montanis etiam circa Comum, et observatur haud rara in ambulacris. Fl. junio, julio.

668. CISTUS *salvifolius* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1184.

Vidi in rupibus prope *Corenno*, atque inter saxa infra pagum *di Albonico*. Fl. majo, junio.

669. CISTUS *Fumana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1191.

Abundat in collibus aridis *Como vicinioribus, al Ponte Molinello, a Pizzo, Moltrasio, et in monte S. Martino supra Griante*. Fl. junio, julio.

670. CISTUS *marifolius* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1195.

Mihi occurrit in monte *il Sasso di Musso* nuncu-

pato, atque a *S. Martino* supra *Griante*. Fl. junio julio.

671. *CISTUS alpestris* Crantz. *Stirp. Austr. p.* 165.

*C. italicus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 2. p.* 1193.

Legi in monte *Canzo* florentem julio.

672. *CISTUS pilosus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 2. p.* 1206.

Nascitur ad margines agrorum collium, et fl. junio, julio.

673. *CISTUS Helianthemum* Linn. *spec. pl. ed.*

*Willd. T. 2. p.* 1370.

Frequens est in pascuis, atque in marginibus agrorum collium, et montium. Fl. vere, aestate.

674. *PAEONIA officinalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 2. p.* 1221.

Oritur in montibus *di Blevio*, *Generoso*, *Gordona*, *Canzo* ec. ultra regionem *Fagi*. Fl. junio, julio.

675. *DELPHINIUM Consolida* Linn. *spec. pl. ed.*

*Willd. T. 2. p.* 1061.

Crescit in arvis praesertim collinis. Fl. majo, junio, julio.

676. *ACONITUM Lycotonum* Linn. *spec. pl. ed.*

*Willd. T. 2. p.* 1252.

Habitat in montibus *Larii lacus*, et *Vallis Intelvi* praesertim in monte *Generoso*. Fl. julio, agosto.

677. *ACONITUM Napellus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*

*T. 2. p.* 1235.

Provenit in montibus *Vallium Sasina*, et *Cavargna* inter terminos *Juglandis*, atque *Fagi*. Invenitur etiam in locis regionem *Abietis* attingentibus. Floret julio, agosto.



678. *ACONITUM neomontanum* Willd. *spec. pl.*  
T. 2. p. 1156.

Haud rarum in montibus Larii lacus, atque Vallium  
*Intelei*, *Sasina*, et *Carargna*. Fl. julio, augusto.

679. *ACONITUM acutum* ? Reichenbach. *Monogr.*  
*Aconit.* p. 95 tab. 14.

*A. cuculli calcare obtuso, galeâ convexâ, foliis  
quinque-partitis, laciniis subtrifidis incisissimis lineari-  
lanceolatis.*

Caulis simplex, subangulatus, firmus, rare foliosus.  
Florum spica terminalis, longa, simplex. Pedun-  
culi uniflori, breves, pubescentes. Corolla violacea,  
galeâ fornicatâ breviter rostratâ glabriusculâ, petalis  
lateralibus latis subrotundis ciliatis, inferioribus fere  
ellipticis. Folia longe petiolata, quinquepartita,  
laciniis lineari-lanceolatis acutis integris, supra laete  
viridia, subtus glauca, utrinque nuda.

Species haec, valde proxima stirpi a celebri Reichen-  
bachio sub nomine *Aconiti acuti* descriptae, obvenerit  
mihi in valle, quae ducit ad pascua montis *Bian-  
dino* inter Fagi et Abietis regiones. Fl. ineunte  
augusto.

680. *ACONITUM callibotryon* Reichenbach. *Monogr.*  
*Aconit.* p. 98. tab. 16.

Decerpsi eodem loco ubi praecedens reperi. Fl. augusto.

681. *AQUILEGIA vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 2. p. 1245.

Abundat in sylvis ad radices montium Larii lacus,  
et in pratis montanis circa *Comum*. Fl. maio, junio,  
julio. *Var.* flore cupreo reperi in monte *Canzo*.

682. *AQUILEGIA pyrenaica* Decand. *Fl. fr.* T. 5.  
p. 650.

Reperitur in montibus *Coleno*, *Canzo*, *S. Primo*,  
et etiam inter scopulos uelle *Crosgalle* prope *Bel-  
lagio*. Fl. julio, agosto.

685. ANEMONE *Hepatica* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1272.

Frequens est in sylvis collinis et montanis totius fere  
Provinciae. Fl. martio, aprili.

684. ANEMONE *vernalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1275.

Haud rara est in montibus *Canzo*, *Generoso*, *Pizzo  
di Gino*, *Costa piatta* ec. Fl. junio, julio.

685. ANEMONE *apiifolia* Willd. spec. pl. T. 2.  
p. 1276.

*A. sulphurea* Linn. Mantiss. 78.

Obviam mihi venit in pratis montium *Generoso*, *Gor-  
dona*, *Canzo*, atque in pascuis editioribus *Vallis  
Cavargna*. Fl. junio, julio.

686. ANEMONE *nemorosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1281.

Nascitur in sylvis atque nemoribus etiam circa *Comum*.  
Fl. aprili, majo.

687. ANEMONE *ranunculoides* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 1282.

Crescit in sylvis collinis et montanis, atque in locis  
herbidis umbrosis, etiamque juxta sepes circa *Co-  
mum*. Fl. aprili, majo.

688. ANEMONE *narcissiflora* Willd. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 1285.

Occurrit copiose in pascuis montis *Generoso* circa *Ori-  
mento*. Fl. majo, junio, julio.

689. ATRAGENE *alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1285.

Legi fere ad cacumen montis *Canzo* ex parte, quae spectat *Valbrona*. Fl. majo, junio.

690. CLEMATIS *italica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1292.

Nihil vulgatius in sepibus tum montanae, quam planioris Provinciae. Fl. junio, julio.

691. CLEMATIS *erecta* Willd. spec. pl. T. 2. p. 1294.

Habitat in sepibus, et sylvis collinis etiam prope *Comum*. Fl. majo, junio.

692. THALICTRUM *foetidum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1295.

Reperi in locis herbidis apricis *della Tremezzina* inter pagos *Bonzanigo*, *Viano*, et legi florens junio.

693. THALICTRUM *elatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1297.

Invenitur in pratis collinis et planis humidiusculis. Fl. majo, junio, julio.

694. THALICTRUM *majus* Willd. spec. pl. T. 2. p. 1297.

Provenit in locis sylvaticis collinis et montanis, atque fl. majo, junio.

695. THALICTRUM *minus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1297.

Abundat in sylvis, atque pascuis montanis totius Provinciae, et reperitur etiam, sed minus frequens, in pratis collinis. Fl. majo in collibus, et serius in montibus.

696. THALICTRUM *angustifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1299.

Mihi occurrit in pratis montium *Generoso*, *S. Primo*, et *Pizzo di Gino*, inter regiones *Fagi* et *Abietis*. Fl. junio, julio.

697. *THALICTRUM flavum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1500.  
Oritur satis copiose in pratis humidiusculis praesertim  
collium et planitiei. Fl. junio, julio.
698. *THALICTRUM nigricans* Willd. spec. pl. T. 2,  
p. 1500.  
Invenitur in pratis collinis et montanis humidiusculis  
tam prope Comum, quam in Valle Intelvi. Fl.  
majo, junio, julio.
699. *THALICTRUM aquilegifolium* Linn. spec. pl.  
ed. Willd. T. 2. p. 1501.  
Incolit prata humentia collium et montium etiam prope  
Comum. Fl. majo, junio, julio.
700. *RANUNCULUS Flammula* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 1507.  
Communis in fossis, in paludibus, atque ad oras la-  
cum Provinciae. Fl. majo, junio, julio.
701. *RANUNCULUS reptans* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 1507.  
Occurrit in prato Pasquè dicto extra urbem. Fl. apri-  
li, majo.
702. *RANUNCULUS Lingua* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1508.  
Frequens est in locis paludosis, atque ad oras lacuum  
d'Alserio, Segrino, Varese, Piano prope Porlezza  
ec. Fl. junio, julio.
703. *RANUNCULUS Ficaria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1512.  
Crescit in locis humidiusculis et umbrosis totius fere  
Provinciae, et praesertim ad sepes circa Comum.  
Fl. aprili, majo.

704. RANUNCULUS *Thora* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1512.  
Abundat in pratis montium *Canzo*, *Codeno*, *S. Primo*, et *Generoso*, ubi obviam venit a regione *Fagi* usque ad illam *Abietis* et *Mughi*. Fl. junio julio, agosto.
705. RANUNCULUS *sceleratus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1515.  
Provenit in aquis lente fluentibus, atque in pascuis paludosis. Fl. majo, junio, julio.
706. RANUNCULUS *aconitifolius* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1515.  
Oritur in montibus *Boletto* supra *Ponzate*, *Bisbino*, *Gorlona* atque *Generoso*. Fl. majo, junio, julio.
707. RANUNCULUS *glacialis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1520.  
Legi in montibus editioribus *Vallis Cavargna*, *Legnone*, et *Codeno*. Fl. junio, julio ad nivem deliquescentem.
708. RANUNCULUS *montanus* Willd. spec. pl. T. 2. p. 1521.  
Obviam mihi venit in monte *Canzo*, atque in pascuis montis *Generoso*. Fl. majo, junio.
709. RANUNCULUS *bulbosus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1524.  
Communis est in pratis. Fl. aprili, majo, junio.
710. RANUNCULUS *repens* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 2. p. 1525.  
Abundat ad margines agrorum, atque in pratis humentibus, locisque umbrosis. Fl. aprili, majo, junio, julio.

711. *RANUNCULUS acris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1526.  
Vulgatissimus in pratis, atque pascuis udis. Fl. majo,  
junio, julio.
712. *RANUNCULUS lanuginosus* Linn. spec. pl.  
ed. Willd. T. 2. p. 1527.  
Reperitur abunde ad sepes, atque in dumetis Vallis  
*Intelvi*, praesertim circa pagos di *S. Fedele*, *Laino*,  
et *Pellio inferiore*. Fl. majo, junio, julio.
713. *RANUNCULUS arvensis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 1529.  
Frequens ad margines agrorum, et in arvis. Fl. majo,  
junio.
714. *RANUNCULUS aquatilis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 2. p. 1552.  
Habitat in fossis, atque in aquis lente fluentibus etiam  
extra moenia urbis. Fl. majo, junio.
715. *TROLLIUS europaeus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1553.  
Vidi in montibus totius fere Provinciae. Fl. majo,  
junio.
716. *HELLEBORUS niger* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1556.  
Crescit copiose in sylvis montium Como viciniorum,  
et abundat etiam in Vallibus *Menaggio*, *Ganna*,  
atque *Assina*. Fl. decembri, januario, februario,  
in locis humilioribus, atque martio, aprili in  
montanis.
717. *HELLEBORUS viridis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1556.  
Oritur ubique in sylvis collinis et montanis umbrosis.  
Fl. januario, februario, martio, aprili.

718. *HELLEBORUS foetidus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1557.

Observavi plurimum in locis, et satis copiose juxta torrentes prope pagos *di Erba et Lezza*. Fl. februario, martio, aprili.

719. *CALTHA palustris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 1558.

Incolit loca palustria, et praesertim prata circa pagos *di Cernobbio, Mashanico, Erba, et Mariaga*. Fl. majo, junio.

## CL. XIV. DIDYNAMIA.

### GYMNOSPERMIA.

720. *AJUGA pyramidalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 8.

Frequens in pratis montanis et collinis. Fl. junio, julio.

721. *AJUGA alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 9.

Reperi in montibus Vallium *Cavargna, et Sasina*. Fl. junio, julio, augusto.

722. *AJUGA genevensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 9.

Habitat ad margines agrorum, atque in pratis praesertim collinis. Fl. aprili, majo.

723. *AJUGA reptans* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5.  
p. 10.

Abundat in pascuis siccis, et ad margines agrorum  
praesertim in locis collinis etiam circa Comum.  
Fl. aprili, maio.

724. AJUGA *Chamaecpitys* Schreber. *Willd. spec. pl.*  
*T. 3. p. 10.*

Occurrit in locis aridis collinis. Fl. vere, aestate.

725. TEUCRIUM *Scorodonia* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 24.*

Reperitur in sylvis montanis ubique, etiam prope  
Comum. Fl. junio, julio.

726. TEUCRIUM *Scordium* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 27.*

Haud rarum est in fossis, atque locis humentibus hu-  
milioris Provinciae. Fl. junio, julio, agosto.

727. TEUCRIUM *Chamaedrys* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 28.*

Commune ad margines agrorum, atque in locis her-  
bidis adclivibus collium prope Comum. Fl. junio,  
julio.

728. TEUCRIUM *montanum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 31.*

Oritur in collibus, atque montibus totius Provinciae.  
Fl. junio, julio.

729. SATUREJA *juliana* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 41.*

Decerpsi in locis aridis collium urbi viciniorum, a  
*Garzola*, et supra *Geno*. Fl. junio, julio.

730. SATUREJA *montana* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 43.*

Habitat in montibus Vallium *Intelvi*, et *Assina*. Fl.  
junio, julio.



751. *SATUREJA hortensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 45.

Abundat in hortis, atque in arvis collinis circa Comum. Fl. junio, julio.

752. *NEPETA Cataria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 49.

Vulgaris ad vias atque margines agrorum. Fl. julio, agosto.

753. *SIDERITIS montana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 64.

Crescit in arvis praesertim collinis circa pagos di *Erba*, et *Albese*, atque reperitur in agris della *Tremezzina*. Fl. majo, junio.

754. *MENTHA sylvestris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 74.

*M. sylv. var. γ. Mentha rotundifolia auctorum.*

Habitat in pascuis atque locis humentibus. Frequens est circa Comum. Fl. julio, agosto, septembri.

755. *MENTHA nemorosa* Willd. spec. pl. T. 5. p. 75. *M. silvestris* β. Smith. Fl. britan.

Occurrit haud raro in locis umbrosis, atque ad sepes prope Comum. Fl. eodem tempore ac praecedens.

756. *MENTHA viridis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 76.

Nascitur variis in locis circa Comum, at *Roggione*, atque in prato *Pasqué* dicto. Fl. julio, agosto.

757. *MENTHA hirsuta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 78.

Obvenit mihi in paludibus di *Colico*, et *Porlezza*. Fl. julio, agosto.

758. *MENTHA aquatica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 78.

Communis ad aquas lente fluentes , atque in locis palustribus. Fl. julio , augusto , septembri.

739. MENTHA *Pulegium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 82.

Invenitur in pratis humentibus vel inundatis planioris Provinciae , atque in paludibus a Colico , Porlezza ec. Fl. julio , augusto , septembri.

740. GLECHOMA *hederacea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 85.

Vulgatissima in locis herbidis , ad margines arborum , atque ad sepes. Fl. martio , aprili , majo.

741. LAMIUM *laevigatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 86.

Frequens est in locis incultis totius fere Provinciae. Fl. martio , aprili , majo.

742. LAMIUM *maculatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 87.

Obviam venit in sepibus ubique. Fl. martio , aprili , majo.

743. LAMIUM *album* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 88.

Reperitur in ruderatis , in sepibus , atque ad margines agrorum ubique. Fl. vere.

744. LAMIUM *purpureum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 88.

Habitat cum praecedente , et floret eodem tempore.

745. LAMIUM *amplexicaule* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 90.

Commune ad margines agrorum , atque in hortis. Fl. martio , aprili , majo.

746. GALEOPSIS *Ladanum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 91.

Abundat in locis sterilibus arenosis, secus torrentes, atque ad oras Larii lacus. Fl. julio, augusto, septembri.

747. GALEOPSIS *Tetrahit* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 92.

Nascitur in arvis, atque ad pratorum margines plerisque in locis Vallium *Intelvi*, et *Sasina* ec. Fl. junio, julio, augusto.

748. GALEOPSIS *cannabina* Willd. spec. pl. T. 5. p. 95.

*G. versicolor* Decand. Fl. fr. T. 5. p. 544.

Reperi in campis a *Laino* in Valle *Intelvi*, et legi floridam julio, augusto.

749. GALEOBDOLON *luteum* Willd. enum. p. 614.

Provenit in sylvis montium Vallis *Intelvi*, *Canzo*, *Ponzate* ec. Fl. junio, julio.

750. BETONICA *officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 95.

Crescit in sylvis, atque in locis aridis incultis totius Provinciae. Fl. junio, julio, augusto.

751. BETONICA *Alopecuros* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 94.

Provenit copiose in montibus Larii lacus, atque ad ejusdem oras nelle *Crosgalle* prope *Bellagio*.

Fl. junio, julio.

752. BETONICA *hirsuta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 95.

Legi in pascuis montis *Biandino* in Valle *Sasina*. Fl. julio, augusto.

753. STACHYS *sylvatica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 97.

116 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA

Invenitur in sylvis, atque in sepibus collium et montium urbi viciniorum. Fl. majo, junio, julio.

754. *STACHYS palustris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 98.

Crescit in locis palustribus a Colico. Fl. julio, augusto.

755. *STACHYS alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 98.

Oritur in sylvis montium urbi imminentium, atque in nemoribus, et sepibus montium Larii lacus, et Vallis Intelvi. Fl. junio, julio, augusto.

756. *STACHYS germanica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 99.

Crescit in locis apricis collium et montium circa Comum, et in Valle Intelvi. Fl. junio, julio.

757. *STACHYS recta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 104.

Vulgaris in sylvis, atque locis umbrosis collium et montium Como viciniorum. Fl. majo, junio, julio.

758. *STACHYS annua* Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 5. p. 105.

Occurrit in locis apricis collinis circa Comum, atque in Brianza ec. Fl. julio.

759. *BALLOTA nigra* Linn. sp. pl. ed. Willd. T. 5. p. 107.

Frequens est ad sepes, atque in locis incultis. Fl. junio, julio.

760. *MARRUBIUM vulgare* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 111.

Colitur in hortis, et sponte crescit in locis saxosis apricis della Tremezzina supra S. Abbondio. Fl. majo, junio, julio.

761. *LEOMURUS Cardiaca* Linn. *sp. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 114.

Crescit in ruderalis variis in locis. Fl. julio, agosto.

762. *CLINOPODIUM vulgare* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 151.

Abundat ad sepes, atque ad margines agrorum in collibus Como vicinioribus a *Garzola*, *Geno*, *Blevio*, &c. Fl. junio, julio, agosto.

765. *ORIGANUM vulgare* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 155.

Habitat in locis aridis saxosis, atque in dumetis collium et montium Como propiorum &c. Fl. junio, julio.

764. *THYMUS Serpyllum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 158.

Communis ad margines agrorum, atque in pratis praesertim collinis. Fl. maio, junio, julio.

765. *THYMUS Acinos* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 142.

Nascitur in locis aridis, atque in pratis siccis ubique. Fl. maio, junio, julio.

766. *THYMUS patavinus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 142.

Reperitur in collibus circa *Comum*, atque in alveo torrentis *Cosia*. Fl. junio, julio, agosto.

767. *THYMUS montanus* Willd. *spec. pl. T. 5.*  
p. 145.

*T. panonicus* Allioni. *ped. N.* 77.

Incolit colles Como viciniores, arcem *Baradello*, *Carlano*, *Garzola*, &c. Fl. maio, junio.

768. *THYMUS alpinus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 142.

Oecurrit in montibus omnibus Larii lacus, atque  
Vallis *Intelvi*. Fl. junio, julio.

769. MELISSA *officinalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 146.*

Frequens est in montibus Provinciae, praesertim in  
Valle *Intelvi*. Fl. julio, agosto.

770. MELISSA *Calamintha* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 147.*

Haud rara ad vias, atque in locis sterilibus aridis  
collium Como viciniorum. Fl. julio, agosto.

771. MELISSA *Nepeta* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 147.*

Crescit ad vias, atque sepes collium, et etiam in locis  
glareosis circa Comum. Fl. julio, agosto.

772. MELISSA *grandiflora* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 147.*

Habitat in montibus urbi propioribus, atque supra  
*la Madonna del monte di Varese* loco dicto *il prato  
dei fiori*. Fl. junio, julio, agosto.

773. MELISSA *pyrenaica* Willd. *spec. pl. T. 3.*  
*p. 148.*

Reperitur in montibus fere omnibus Provinciae a  
regione Fagi usque ad illam Abietis, et descendit  
ad oras Larii lacus prope pagos *di Bellagio*,  
*Griante*, *Rezzonico*, &c. Fl. junio, julio.

774. MELITTIS *Melissophyllum* Linn. *spec. pl.*  
*ed. Willd. T. 3. p. 157.*

Abundat in sylvis colliuis et montanis etiam prope  
Comum. Fl. maio, junio, julio.

775. SCUTELLARIA *galericulata* Linn. *spec. pl.*  
*ed. Willd. T. 3. p. 175.*

Ocitur in pratis humentibus, in fossis, et secus rivos multis in locis. Fl. junio, julio, agosto.

776. PRUNELLA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 5. p. 176

Occurrit abunde in pascuis, atque ad margines agrorum herbidos praesertim in collibus. Fl. julio, agosto.

γ P. *intermedia* Linck. *Annal.* 1.

δ P. *parviflora* Poiret. *itin.* 2. p. 188.

Haec varietates inveniuntur iisdem in locis cum specie, et fl. eodem tempore.

777. PRUNELLA *grandiflora* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 5. p. 177.

β. P. *laciniata* Linn. *spec. pl.* 857.

Communis est species cum varietate in pratis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. aestate.

#### ANGIOSPERMIA.

778. BARTSIA *alpina* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 5. p. 185.

Obviam mihi venit in montibus Vallis *Cavargna Garzirola* et *Tabano* dictis, et legi etiam in alpibus *Legnone* atque *Biandino* in pratis regionem alpinam inferiorem attingentibus. Fl. julio, agosto.

779. RHINANTHUS *Crista galli* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 5. p. 188.

β. *Crista galli angustifolia montana* Bauh. *pin.* 165. *prol.* 86.

Vulgatissimus in sylvis, atque in pratis etiam planitiei. Varietas β reperitur in montibus. Fl. maio, junio, julio.

780. *EUPHRASIA officinalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 195.*  
 Nascitur in pascuis aridis ubique. Fl. majo, junio, julio.  
 β. *E. minima* Jacq. *Decand. Fl. fr. T. 5. p. 473.*  
 Legi in monte *Legnone* in regione *Abietis*. Fl. julio, agosto.
781. *EUPHRASIA salisburgensis* Willd. *spec. pl. T. 5. p. 195.*  
 Habitat in pratis siccis montium *di Brunate, Civiglio, Solzago, ec.* Fl. julio, agosto, septembri.
782. *EUPHRASIA lutea* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 195.*  
 Frequens est in locis sterilibus collinis prope *Comum*, atque in sylvis aridis *Vallis Intelvi, Tremezzina, Griante, Rezzonico, ec.* Fl. agosto, septembri.
783. *EUPHRASIA Odontites* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 194.*  
*E. serotina* Lam. *Fl. fr. 2. p. 350.*  
 Reperi in locis sterilibus circa *Comum*, atque ad margines agrorum *a Colico*, ubi florentem legi exeunte agosto.
784. *MELAMPYRUM arvense* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 198.*  
 Reperitur in agris praesertim collinis prope *Comum*, et abundat in arvis *della Brianza*. Fl. majo, junio.
785. *MELAMPYRUM sylvaticum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 199.*  
 Oritur in sylvis collinis prope *Comum*, atque in montibus *Vallis Intelvi*. Fl. junio, julio, agosto.
786. *PEDICULARIS foliosa* Willd. *spec. pl. T. 5. p. 211.*



Decerpsi in jugis montis *Generoso* inter saxa. Fl. junio, julio.

787. PEDICULARIS *rostrata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 216.

Legi in montibus *Legnone*, *Pizzo di Gino*, *Garzirola*, et *Aigua* in Valle *Cavargna* supra Abietis regionem. Fl. junio julio, agosto.

788. PEDICULARIS *tuberosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 217.

Inveni in montibus *di Canzo*, atque Vallium *Cavargna*, et *Sasina*, regionem alpinam inferiorem attingentibus. Fl. junio, julio.

789. PEDICULARIS *fasciculata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 218.

Abundat in pratis montis *Generoso*, et occurrit etiam in montibus Vallis *Cavargna*, *Canzo*, atque *Codelno*, a termino Fagi usque ad litem subalpinum. Fl. junio, julio, agosto.

790. PEDICULARIS *comosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 220.

Obviam venit in montibus Vallium *Cavargna*, *Sasina*, *Dongo*, et *Livo* regionem Abietis superantibus. Fl. junio, julio.

791. ANTIRRHINUM *Cymbalaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 252.

Vulgare in muris antiquis. Fl. vere, aestate.

792. ANTIRRHINUM *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 248.

Habitat ad summitatem montis *Legnone*. Fl. junio, julio.

793. ANTIRRHINUM *minus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 251.

- Crescit in arvis aridis, atque in locis incultis ubique.  
Fl. junio, julio, agosto.
794. ANTIRRHINUM *Linaria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 255.  
Commune in locis incultis, atque ad margines agrorum  
ubique. Fl. totâ aestate.
795. ANTIRRHINUM *majus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 256.  
Vidi variis in locis supra muros vetustos, praesertim in  
*Tremezina* Fl. vere, aestate.
796. ANARRHINUM *bellidifolium* Willd. spec. pl.  
T. 5. p. 260.  
Reperi in sylvis, et ericetis meridionalis Provinciae  
prope pagos di *Bregnano*, *Lomazzo*, et *Cermenate*.  
Fl. junio, julio.
797. SCROPHULARIA *nodosa* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 270.  
Oritur in sepibus, et dumetis umbrosis ubique, et fl.  
junio, julio, agosto.
798. SCROPHULARIA *aquatica* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 270.  
Occurrit in fossis pratorum humentium, in *Falleggio*  
prope *Comm*, atque *all'Acqua negra ec.* Fl. junio,  
julio, agosto.
799. SCROPHULARIA *canina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 277.  
Observatur satis frequens in muris, atque in locis  
sterilibus totius fere Provinciae. Fl. totâ aestate.
800. DIGITALIS *purpurea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 285.  
Haec species colitur in montibus ab herbariis, qui

illam pharmacopolis tum hujus Provinciae quam mediolanensis vendunt. Nunquam vidi spontaneam nostris in alpidibus, quamvis alii dixerint se observasse et abunde. Si verum mihi relatum fuit crescit non culta in monte *di Brincio* in Valle *Curva*. Fl. aestate.

801. DIGITALIS *lutea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 284.

Vulgatissima species in montibus, collibus, et sylvis.  
Fl. junio, julio.

802. DIGITALIS *ambigua* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 285.

Provenit in montibus *Canzo*, *Codeno*, *S. Primo* &c.  
Fl. junio, julio.

803. BIGNONIA *Catalpa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 289.

Arbor Japoniae et Carolinae indigena publica exornat ambulacra variis in Provinciae locis. Fl. junio.

804. LINDERNIA *Pyxidaria* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 325.

Legi in locis palustribus a *Colico*. Fl. julio, agosto, septembri.

805. OROBANCHE *major* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 347.

Crescit in sylvis, atque in locis sterilibus aridis collium et montium. Fl. maio, junio.

806. OROBANCHE *ramosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 355.

Nascitur ad margines agrorum in locis collinis etiam prope *Comum*. Fl. maio, junio.

## CL. XV. TETRADYNAMIA.

## SILICULOSA.

807. **M**YAGRUM *perfoliatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 407.

Haud rarum est in arvis collinis. Fl. majo, junio.

808. MYAGRUM *sativum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 408.

Colitur in agris prope Comum, a *Grandate*, *Lucino* ec. Fl. majo.

809. MYAGRUM *saxatile* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 409.

Reperitur in montibus omnibus Larii lacus, atque Vallium *Cavargna* et *Sasina*. Fl. junio, julio.

810. DRABA *Aizoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 424.

Legi in monte *Biaudino* florentem julio.

811. DRABA *verna* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 426.

Oritur in muris propugnaculorum urbis, atque in locis arenosis. Frequens est ad alveum torrentis *Cosia*. Fl. februario, martio.

812. LEPIDIUM *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 435.

Mihi occurrit in montibus *Coleno*, *Biaudino*, *Legnone*, inter rupium fissuras. Fl. julio, angusto.

813. LEPIDIUM *rudérale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 440.

Commune in muris et ruderatis. Fl. vere, aestate.

TETRADYNAMIA SILICULOSA. 125

814. *LEPIDIUM Iberis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 441.  
Frequens ad vias, ad muros, atque in ruderatis. Fl.  
junio, julio, augusto.
815. *THLASPI arvense* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 442.  
Crescit in arvis montanis et collinis Vallis *Intelvi*,  
atque *della Brianza*. Fl. junio, julio.
816. *THLASPI campestre* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 444.  
Habitat in campis montanis et collinis etiam prope  
Commun. Fl. aprili, maio,
817. *THLASPI perfoliatum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 446.  
Occurrit ad vias, et in arvis planioris Provinciae.  
Fl. vere.
818. *THLASPI Bursa pastoris* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 447.  
Vulgatissimum secus vias, in arvis, atque in locis  
incultis. Fl. vere, aestate.
819. *IBERIS saxatilis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 455.  
Inveni in locis saxosis montium, praesertim *della*  
*Tremezzina* supra pagum *di S. Abbondio*, atque  
supra *il Sasso rancio*. Fl. junio, julio.
820. *IBERIS rotundifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 454.  
Provenit in montibus *Larii lacus*, *Grona*, *Pizzo di*  
*Gino*, *Aigua*, ec. regionem subalpinam pertingen-  
tibus. Fl. junio, julio.
821. *BISCUTELLA auriculata* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 472.

Nascitur in montibus omnibus Larii lacus. Fl. majo, junio.

822. BISCUTELLA *laevigata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 474.

Invenitur in pascuis siccis montium Como viciniorum, atque in Valle *Intelvi*. Fl. majo, junio, julio.

825. LUNARIA *rediviva* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 476.

Obviam venit in montibus urbi vicinioribus, et in vallecula *Valle Duce* dicta supra *S. Croce*. Crescit etiam in aliis Provinciae locis montosis, et fl. majo.

824. DENTARIA *bulbifera* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 479.

Reperi in sylvis montis *Canzo*. Fl. majo, junio.

825. DENTARIA *pinnata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 480.

Provenit in montibus *Canzo*, *Gordona*, et alibi. Fl. junio, julio.

826. DENTARIA *pentaphyllos* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 480.

Oritur in sylvis montium *di Brunate*, *Ponzate*, *ec.* Fl. junio, julio.

827. CARDAMINE *asarifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 482.

Vidi secus rivulos in monte *Bianlino*, et legi florentem augusto. Pro *Cochlearia officinali* habetur, et venditur ab herbariis.

828. CARDAMINE *resedifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 482.

Habitat in montibus *Legnone*, *Codeno*, *Bianlino*, atque *Pizzo di Gino*, in quibus abunde reperitur ad nivem deliquescentem. Fl. julio, augusto.

829. CARDAMINE *impatiens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 485.

Frequens est in pratis humidiusculis et umbrosis,  
atque ad margines agrorum herbidos in locis collinis  
prope Commun. Fl. aprili, maio.

830. CARDAMINE *parviflora* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 485.

Abundat ad muros, secus vias, atque in arvis hor-  
torum. Fl. primo vere.

831. CARDAMINE *hirsuta* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 486.

Haud rara ad vias, in arvis, atque hortis. Fl. eodem  
tempore ac praecedens.

832. CARDAMINE *pratensis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 487.

Nascitur abunde in pratis humidiusculis di S. Giu-  
seppe in Falleggio prope Commun. Fl. aprili,  
maio.

833. SISYMBRIUM *Nasturtium* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 489.

Crescit ad fontes, atque rivos ubique. Fl. maio, junio,  
julio.

834. SISYMBRIUM *sylvestre* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 489.

Occurrit in pratis humidis, atque in ruderatis prae-  
sertim planioris Provinciae. Fl. maio, junio, julio.

835. SISYMBRIUM *amphibium* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 491.

Incolit loca palustria, et arva humentia. Fl. vere.

836. SISYMBRIUM *Sophia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 2. p. 500.

128 TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

Reperitur in locis incultis, muris, maceriis, atque tectis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

857. *SISYMBRIUM tenuifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 495.

Oritur in locis incultis, et etiam ad muros propugnaculorum urbis. Fl. junio, julio.

858. *ERYSIMUM officinale* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 509.

Commune in locis incultis. Fl. vere, aestate.

859. *ERYSIMUM Barbarea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 509.

Provenit in locis humentibus, atque in pratis udis totius fere Provinciae. Fl. aprili, majo, junio.

840. *ERYSIMUM Alliaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 510.

Vulgare in sepibus, atque locis umbrosis. Fl. vere.

841. *CHEIRANTHUS erysimoides* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 514.

Decerpsi in monte *Pizzo di Gino* in Valle Cavargna. Fl. junio, julio.

842. *CHEIRANTHUS helveticus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 515.

Nascitur in montibus Larii lacus copiose, et descendit etiam ad eorum radices. Diligit torrentium alveos et loca glareosa. Fl. junio, julio.

845. *CHEIRANTHUS Cheiri* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 516.

Colitur in hortis cum var. fl. pl. Fl. aprili, majo.

844. *CHEIRANTHUS incanus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 520.

Excolitur cum præcedente in hortis, ubi fl. vere, aestate.



845. *HESPERIS matronalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 551.

Crescit in collibus prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

846. *ARABIS alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 554.

Habitat in montibus Vallium *Cavargna* et *Sasina* a termino *Abietis* usque ad limitem regionis subalpinae. Fl. junio, julio.

847. *ARABIS thaliana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 555.

Frequens est in muris, atque in locis aridis incultis. Abundat in propugnaculis urbis. Fl. primo vere.

848. *ARABIS Turrita* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 541.

Abundat in montibus, et etiam in locis collinis urbi propioribus. Fl. majo, junio.

849. *TURRITIS glabra* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 542.

Occurrit in locis glareosis collinis circa Comum. Fl. majo, junio.

850. *TURRITIS hirsuta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 545.

Invenitur in locis aridis, in muris etiam propugnaculorum urbis, atque in sepibus a *Geno*. Fl. aprili, majo.

851. *TURRITIS sagittata* Bertolonii. *Amoen. ital.* p. 166.

*Arabis sagittata* Decand. Fl. fr. vol. 6. p. 592.

Nascitur ad muros, atque inter saxa circa Comum, supra *S. Agostino*, *S. Giuliano*, *Geno*. Fl. aprili, majo.

852. BRASSICA *Napus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 547.

Colitur in campis, et fl. martio, aprili.

853. BRASSICA *Rapa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 548.

β. *Rapa sativa oblonga s. femina* Bauh. pin. 89.

Excolitur in arvis, atque hortis. Fl. martio, aprili.

854. BRASSICA *oleracea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 548.

β. *B. (oleracea viridis) alba vel viridis* Bauh. pin. 111.

δ. *B. (oleracea capitata) capitata alba* Bauh. pin. 111.

ε. *B. (oleracea sabauda) alba crispa* Bauh. pin. 111.

ι. *B. (oleracea botrytis) cauliflora* Bauh. pin. 111.

*B. (oleracea botrytis) viridis* Ic. Moris. oxon.  
sect. 111. T. 1. fig. 11.

λ. *B. (oleracea gongylodes) gongylodes* Bauh. pin. 111.

*B. caulo-Rapa* Bauh. hist. 2. p. 829.

Species cum varietatibus excolitur in hortis, atque in campis. *B. cauliflora*, et *B. botrytis viridis*, vulgo *Cavolo fiore*, et *Broccolo* coluntur magnâ copiâ in montibus Larii lacus prope casas pastorum. Fl. majo, junio, julio.

855. BRASSICA *Erucastrum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 551.

Oecurrit in rudertis, ad vias, atque in locis siccis sterilibus. Fl. vere, aestate.

856. BRASSICA *Eruca* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 551.

Colitur in hortis. Fl. aprili, majo.

857. RAPHANUS *sativus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 560.

## TETRADYNAMIA SILIQUOSA. 131

Excolitur in hortis cum *varietatibus*, et fl. majo, junio.

858. RAPHANUS *Raphanistrum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 560.*

Haud infrequens in campis inter segetes praesertim in planiori Provincia. Fl. majo, junio.

859. RAPHANUS *Landra* Decand. *Syst. nat. 11. p. 668.*

Crescit in campis planioris Provinciae. Fl. majo, junio.

## CL. XVI. MONADELPHIA.

### PENTANDRIA.

860. **E**RODIUM *ciconium* Willd. *spec. pl. T. 3. p. 629.*

Habitat ad vias, in ruderibus, atque in locis herbosis collium. Frequens circa Comum. Fl. aprili, majo.

861. ERODIUM *cicutarium* Willd. *spec. pl. T. 3. p. 629.*

Vulgare ad vias, atque in locis sterilibus. Fl. aprili, majo.

## DECANDRIA.

862. GERANIUM *sanguineum* Linn. *spec. pl. ed.*  
Willd. T. 3. p. 697.  
Nascitur in pratis siccis montanis, atque in sylvis col-  
linis circa Comum. Fl. majo.
863. GERANIUM *nodosum* Linn. *spec. pl. ed.* Willd.  
T. 3. p. 701.  
Abundat in locis montanis umbrosis, et etiam in  
sylvis a S. *Abbondio* prope Comum. Fl. majo,  
junio.
864. GERANIUM *sylvaticum* Linn. *spec. pl. ed.* Willd.  
T. 3. p. 703.  
Commune in sylvis, et pratis montium Vallium *In-*  
*telvi*, *Cavargna ec.* Fl. junio, julio.
865. GERANIUM *pratense* Linn. *spec. pl. ed.* Willd.  
T. 3. p. 705.  
Reperitur in pascuis montium totius Provinciae. Fl.  
junio, julio.
866. GERANIUM *molle* Linn. *spec. pl. ed.* Willd.  
T. 3. p. 710.  
Oritur in agris, pratis, atque hortorum arcis ubique.  
Fl. aprili, majo.
867. GERANIUM *columbinum* Linn. *spec. pl. ed.*  
Willd. T. 3. p. 711.  
Occurrit in agris, et pascuis collinis etiam prope  
Comum. Fl. aprili, majo.
868. GERANIUM *robertianum* Linn. *spec. pl. ed.*  
Willd. T. 3. p. 714.  
Vulgatissima species in sepibus, aggeribus, atque ru-  
deratis, locisque umbrosis collium, et montium.  
Fl. aprili, majo, junio.

## POLYANDRIA.

869. *ALTHAEA officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 770.

Vidi ad fossarum margines, et in locis subhumidis  
humidioris Provinciae, atque legi prope *Varese*.  
Fl. junio, julio, agosto.

870. *ALTHAEA rosea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 775.

Hæc species cum *varietatibus* flore albo, rubro, pu-  
niceo, luteo, duplici et simplici colitur in hortis.  
Fl. junio, julio, agosto.

871. *MALVA Morenii* Pollin. fl. veron. T. 2. p. 457.  
*Alcea procerior magno flore* Segu. fl. veron. 111.  
p. 76.

Inveni in locis collinis prope *Comum*, et florentem  
legi julio, agosto.

872. *MALVA rotundifolia* Linn. sp. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 786.

Oritur in hortis, et ruderatis. Fl. junio, julio.

873. *MALVA sylvestris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 787.

Provenit copiose in hortis, atque in limitibus agro-  
rum. Fl. aestate.

874. *MALVA Alcea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 790.

Reperitur in locis incultis, in sepibus, atque ad mar-  
gines agrorum praesertim in collibus prope *Comum*.  
Fl. julio, agosto, septembri.

## CL. XVII. DIADELPHIA.

## HEXANDRIA.

875. **F**UMARIA *bulbosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 860.

Habitat in locis umbrosis ad radices montium, atque  
in sylvis prope Comum, copiose a S. *Abbondio*.  
Fl. martio, aprili.

876. FUMARIA *lutea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5.  
p. 865.

Abundat in locis umbrosis humentibus montium,  
atque in rupestribus a *Blevio*, *alla Pliniana*, ad  
*Urio*, *Brienno* ec. Fl. majo, junio, julio, agosto.

877. FUMARIA *Capnoides* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 866.

Crescit in monte *Canzo*, *al Bwo del piombo* supra  
*Erba*, et alibi. Fl. junio, julio, agosto.

878. FUMARIA *officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 867.

Obviam venit in hortis, atque in locis cultis ubique.  
Fl. martio, aprili, majo.

## OCTANDRIA.

879. POLYGALA *amara* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 872.

Nascitur in pascuis montanis, et in sylvis apricis etiam  
prope Comum. Fl. majo, junio, julio, agosto.

880. POLYGALA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 875.

Inventur satis copiose in pratis, et sylvis montanis  
atque collinis. Fl. a majo in autumnum.

881. POLYGALA *Chamaebuxus* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd.* T. 5. p. 890.

Copiosissima haec species est non solum in sylvis collinis  
circa Comum: sed etiam in montibus totius fere Pro-  
vinciae. Variat alis albis et rubris. Fl. aprili, majo.

DECANDRIA.

882. SPARTIUM *scoparium* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 955.

Vulgare in sylvis collinis et montanis totius Provin-  
ciae. Fl. majo, junio, julio.

883. SPARTIUM *radiatum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 954.

Reperi magnâ copiâ in montibus *di Mandello*. Fl.  
junio, julio, augusto.

884. GENISTA *sagittalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 958.

Decerpsi in *Valmeria* supra *Mandello*. Fl. junio, julio.

885. GENISTA *tinctoria* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 959.

Communis in sylvis, atque in pratis collinis et mon-  
tanis. Fl. junio, julio.

886. GENISTA *germanica* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 944.

Frequens est in sylvis, atque in locis herbosis aridis  
collium et montium. Fl. vere, aestate.

887. *ULEX europaeus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 969.

Crescit in sepibus a Lora prope Comum. Fl. majo, junio, julio.

888. *ONONIS antiquorum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 988.

Invenitur in pratis collinis, et in locis aridis etiam planitiei. Fl. junio, julio.

889. *ONONIS spinosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 989.

Provenit in pratis siccis planioris Provinciae. Fl. majo, junio, julio.

890. *ONONIS hircina* Willd. spec. pl. T. 3. p. 989.  
O. *spinosa*  $\alpha$  *mitis* Linn. spec. pl. 1006.

Abundat in pratis, et pascuis collinis multis in locis. Fl. majo, junio.

891. *ONONIS minutissima* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 992.

Obviam mihi venit in montibus supra *Dongo*, atque sul *Sasso di Musso*, et florentem collegi julio.

892. *ONONIS arvensis* Lam. Dict. 1. p. 505.  
O. *spinosa*  $\beta$  Linn. spec. pl. 1006.

Haec species frequens est in locis aridis circa Comum, al *Ponte Molinello*, et alibi. Fl. junio, julio.

893. *ONONIS Natrix* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 1007.

Reperitur in locis glareosis, atque in torrentium alveis, al *Garovo* prope *Cernobbio* ec. Fl. junio, julio.

894. *ANTHYLLIS Vulneraria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1013.

$\beta$ . A. alis et vexillis albidis subinde rubidis, carinâ apice rubro-purpureâ nitidâ Bertolon. *Amoenit. ital.* p. 591.



In pratis collium, atque in locis herbosis apricis cre-  
scit haec species cum varietate  $\beta$ . Fl. majo, junio,  
julio.

895. ANTHYLIS *montana* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1014.

Inveni in monte di Griante, et legi florentem majo.

896. LUPINUS *albus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 1022.

Colitur in agris. Fl. majo.

897. PHASEOLUS *vulgaris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1030.

Colitur in hortis. Fl. majo, junio, julio, et serius  
ratione temporis sationis.

898. PHASEOLUS *multiflorus* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1030.

Colitur in hortis. Fl. majo, junio.

899. PHASEOLUS *nanus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1036.

Colitur in hortis. Fl. aestate.

900. DOLICHOS *Soja* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 1051.

Exculebatur in hortis uti succedaneum Coffeae arabicae.  
Fl. aestate.

901. DOLICHOS *Catiang* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1051.

Seritur in hortis. Fl. aestate.

902. PISUM *sativum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1070.

Plures hujus speciei varietates coluntur in hortis. Fl.  
martio, aprili, majo, aestate.

903. OROBUS *luteus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1073.

Occurrit in pratis montis *Generoso*, et alibi. Fl. junio, julio.

904. OROBUS *vernus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1075.

Vulgatissimus in locis collinis et montanis ad sepes, in sylvis, atque ad margines agrorum. Fl. vere.

905. OROBUS *tuberosus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1074.

Legi in sylvis collinis prope *Comum*, et in pratis montanis *Vallis Intelvi*. Fl. majo, junio, julio.

906. OROBUS *niger* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1076.

Haud rarus in sylvis collinis prope *Comum*. Fl. majo, junio.

907. LATHYRUS *Aphaca* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1077.

Communis est in locis cultis, atque in agris inter segetes. Fl. majo, junio.

908. LATHYRUS *Nissolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1075.

Legi in arvis collinis *di Lucino*. Fl. majo, junio.

909. LATHYRUS *odoratus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1085.

Colitur in hortis ornamenti causâ. Fl. aestate.

910. LATHYRUS *pratensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1089.

Frequens in pratis collinis, atque ad margines agrorum. Fl. majo, junio, julio.

911. LATHYRUS *sylvestris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1089.

Abundat ad sepes pluribus in locis, et praesertim in *Valle Intelvi*. Fl. majo, junio.

912. LATHYRUS *latifolius* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 3. p. 1089.

Invenitur in dumetis, atque in sepibus Vallis *Intelvi*,  
et *Tremezzina*. Fl. aestate.

913. VICIA *Cracca* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 3.  
p. 1098.

Vulgaris in sepibus, et in campis inter segetes. Fl.  
majo, junio.

914. VICIA *Ervilia* Willd. *spec. pl. T. 3. p. 1103.*  
Habitat in arvis, et fl. majo, junio.

915. VICIA *sativa* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 3.  
p. 1104.

Colitur in campis in meridionali praesertim Provin-  
cia. Fl. majo.

916. VICIA *lutea* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 3.  
p. 1107.

Crescit copiose in agris sterilibus collium et planitiei.  
Fl. majo, junio, julio.

917. VICIA *sepium* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 3.  
p. 1109.

Provenit in sepibus, et dumetis Vallis *Intelvi*, atque  
in sylvis montium *di Ponzate*, *Brunate*, *Solzago*  
ec. Fl. junio, julio.

918. VICIA *Faba* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 3.  
p. 1111.

Colitur in arvis, atque hortis. Fl. aprili, majo.

919. ERVUM *hirsutum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 3. p. 1113.

Obviam venit in arvis, atque locis herbosis planioris  
Provinciae. Fl. aprili, majo.

920. CICER *arietinum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 3. p. 1115.

Colitur in arvis, atque hortis, sed non magnâ copiâ.  
Fl. majo, junio.

921. CICER *Lens* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5.*  
*p. 1114.*

Excolitur in hortis, atque campis. Fl. majo, junio.

922. CYTISUS *Laburnum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 1118.*

Incolit montes totius fere Provinciae, et crescit etiam  
in locis collinis prope Comum. Fl. majo.

923. CYTISUS *nigricans* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 1118.*

Nascitur in locis collinis herbidis, atque in sylvis.  
Fl. majo, junio.

924. CYTISUS *hirsutus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 1122.*

Reperitur in montibus, et collibus urbi vicinioribus,  
ad margines agrorum, in locis herbidis a *Garzola*,  
*Civiglio*, *Brunate* ec. Fl. aprili, majo, junio.

925. CYTISUS *capitatus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 1123.*

Provenit in sylvis collinis et montanis etiam prope  
Comum. Fl. aprili, majo, aestate.

926. CYTISUS *purpureus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 1124.*

Mihi occurrit in monte *di Griante*, atque in locis  
herbidis *delle Crosgalle* inter *Bellagio*, et *Lezzeno*  
fere ad oram lacus. Florentem legi majo.

927. CYTISUS *supinus* Willd. *spec. pl. T. 5.*  
*p. 1125.*

Inveni in pratis, et ad margines agrorum a *Brunate*.  
Fl. majo, aestate.

928. ROBINIA *Pseudacacia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1151.

Colitur a quibusdam in sylvis et educatur multis in  
Provinciae locis ad construendas sepes. Fl. mayo.

929. COLUTEA *arborescens* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1159.

Haud rara in montibus urbi propioribus. Fl. majore,  
junio.

950. CORONILLA *Emerus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1149.

Communis est in sepibus praesertim collinis totius  
Provinciae. Fl. primo vere.

951. CORONILLA *varia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1153.

Vulgatissima in pascuis, et ad margines agrorum  
herbidos. Fl. majore, junio.

952. HIPPOCREPIS *comosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1159.

Oritur in locis apricis montium Como viciniorum.  
Fl. aprili, majore.

953. HEDYSARUM *Onobrychis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1215.

Obviam mihi venit in pascuis, atque ad margines  
agrorum herbidos in *Tremezzina*, a *Bellagio*, atque  
*Griante*. Fl. majore, junio.

954. GALEGA *officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1241.

Crescit ad fossas, atque ad margines agrorum planio-  
ris praesertim Provinciae. Fl. junio, julio.

955. ASTRAGALUS *glycyphyllos* Linn. spec. pl.  
ed. Willd. T. 3. p. 1276.

Nascitur ad margines agrorum, ad sepes, atque praecipue in locis arenosis humentibus planitiei. Fl. junio, julio.

956. *ASTRAGALUS alpinus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1297.

Decerpsi in pratis montium *Pizzo di Gino* et *Generoso* regioni Fagi superioribus. Fl. junio, julio, agosto.

957. *ASTRAGALUS montanus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1502.

Vidi, et legi in pratis subalpinis montium *di Dongo*, *Pizzo di Gino*, *Aigua*. Fl. junio, julio, agosto.

958. *ASTRAGALUS monspessulanus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1514.

Frequens in locis aridis saxosis montium *della Tremezzina* supra *Bonzanigo*, atque *di Griante*. Fl. junio, julio.

959. *TRIFOLIUM officinale* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1555.

*T. officinale*  $\beta$ . Willd. l. c.

Provenit species cum varietate flore albo in pratis, et pascuis siccis collium, atque planitiei. Fl. junio, julio, agosto.

960. *TRIFOLIUM repens* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1559.

Abundat in pratis ubique, et fl. aestate.

961. *TRIFOLIUM alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1560.

Reperitur in pratis subalpinis montium *S. Jorio*, *Pizzo di Gino*, *Legnone*, *Codeno ec.* Fl. julio, agosto.

962. *TRIFOLIUM rubens* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1566.

Occurrit in pratis et pascuis collium prope Comum ,  
supra *S. Giuliano* , *S. Agostino* , a *Garzola* ec.  
Fl. majo. junio.

943. TRIFOLIUM *pratense* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1566.

Cresecit sponte in pratis , et pascuis omnibus , et se-  
ritur in campis. Fl. aprili , majo.

944. TRIFOLIUM *medium* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1567.

Reperi in sylvis collinis circa pagos di *Villa Albese*  
et *Erba*. Fl. junio.

945. TRIFOLIUM *alpestre* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1568.

Habitat in pascuis collinis et montanis. Fl. majo , junio.  
julio.

946. TRIFOLIUM *incarnatum* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1571.

Occurrit in sylvis , et pratis collinis. Legi a *Carlano* ,  
*Garzola* , et *Camnago* prope Comum floridum majo.

947. TRIFOLIUM *arvense* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1573.

Vulgare in campis ubique. Fl. junio , julio.

948. TRIFOLIUM *scabrum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1574.

Mihi occurrit a *S. Croce* prope Comum. Fl. junio.

949. TRIFOLIUM *montanum* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1581.

Reperitur in pascuis montium urbi propioribus , et  
alibi. Fl. majo , junio.

950. TRIFOLIUM *agrarium* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1582.

Commune in pratis, atque agris totius Provinciae.  
Fl. junio, julio, agosto.

951. LOTUS *siliquosus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1386.

Occurrit in pratis humentibus prope Comum, et alibi.  
Fl. majo, junio, julio.

952. LOTUS *hirsutus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1392.

Reperi in sylva, quae est supra *la Pliniana* in regione  
collina. Fl. junio, julio, agosto.

953. LOTUS *corniculatus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1395.

Abundat in pascuis, atque locis herbidis praesertim  
collinis. Fl. aestate.

954. DORYCNIUM *herbaceum* Willd. spec. pl. T. 3.  
p. 1396.

Obviam mihi venit supra *il Sasso di Musso*, in  
locis aridis saxosis inter pagos *di Colunno* et *Sala*,  
atque in monte *Canzo*. Fl. junio, julio.

955. MEDICAGO *sativa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1404.

Sponte crescit in pratis planioris Provinciae, et colitur  
a nonnullis uti gratum bobus pabulum. Fl. majo,  
junio, julio.

956. MEDICAGO *falcata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1405.

Communis in pratis, atque ad margines agrorum  
herbidos. Fl. majo, junio, julio.

957. MEDICAGO *lupulina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1406.

Frequentissima in pratis, et etiam ad vias. Fl. aprili,  
majo, aestate.



958. *MEDICAGO minima* Willd. *spec. pl. T. 5.*  
*p. 1418.*

*M. polymorpha*  $\mu$  *minima* Linn. *spec. pl. 1009.*

Habitat in locis aridis circa Comum, in torrente  
*Cosia, al Ponte Molinello, atque alibi. Fl. vere.*

## CL. XVIII. POLYADELPHIA.

### ICOSANDRIA

959. **CITRUS** *medica* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 5.*  
*p. 1426.*

$\beta$ . *C. Limon.*

*Varietates* hujus speciei permultae coluntur in hortis  
 praecipue *della Tremezzina*, inter quas haud praeter-  
 mittendae sunt *Lima* et *Bergamoto*. Fl. toto fere  
 anno.

960. *CITRUS Aurantium* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 1427.*

Excultur haec species cum *varietatibus Napolino* et  
*Pomo di Adamo* in aliquot hortis *della Tremezzina,*  
*Varese, et Brianza.* Fl. vere, aestate.

### POLYANDRIA.

961. *HYPERICUM Androsimum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 1446.*

Invenitur in locis umbrosis humentibus collium, et  
 montium *Como viciniorum, et praesertim ad ri-*

vulos a *S. Abbondio*, atque al *Ponte Molinello*.  
Fl. junio, julio.

962. *HYPERICUM quadrangulare* Linn. spec. pl. ed.  
*Willd. T. 3. p. 1459.*

Occurrit ad margines rivorum, atque in pratis humidis circa *Comum*, et alibi. Fl. junio, julio.

963. *HYPERICUM perforatum* Linn. spec. pl. ed.  
*Willd. T. 3. p. 1460.*

Provenit copiose in locis aridis saxosis totius fere *Provinciae*, et etiam in muris propugnaculorum urbis. Fl. majo, junio, julio.

964. *HYPERICUM humifusum* Linn. spec. pl. ed.  
*Willd. T. 3. p. 1461.*

Vidi hanc stirpem, quam simplicem puto *varietatem* praecedentis, magnâ copiâ in sylvis prope *Rezzonico*, atque in aliis locis *Larii lacus*. Fl. junio, julio.

965. *HYPERICUM montanum* Linn. spec. pl. ed.  
*Willd. T. 3. p. 1465.*

Frequens est in sylvis montanis etiam *Como vicinioribus*. Fl. junio, julio.

966. *HYPERICUM hirsutum* Linn. spec. pl. ed. *Willd. T. 3. p. 1465.*

Haud rarum in montibus, et collibus *di Brunate, Ponzate, Caviglio, Camnago ec.* Fl. junio, julio.

## CL. XIX. SYNGENESIA.

## ÆQUALIS.

967. **T**RAGOPOGON *pratensis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1492.  
 Communis est in pratis, et pascuis. Fl. majo, junio.
968. TRAGOPOGON *porrifolius* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1493.  
 Colitur uti herba oleracea in hortis. Fl. majo, junio.
969. SCORZONERA *humilis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1499.  
 Nascitur copiose in montibus Como vicinioribus, in pratis supra *Brunate* prope *S. Maurizio*, *al Boletto*, et alibi. Fl. majo, junio.
970. SCORZONERA *hispanica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1499.  
 Excolitur in hortis radicis edulis causâ. Fl. majo, junio.
971. SONCHUS *oleraceus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1514.  
 Vulgatissima species in hortis, atque locis cultis. Fl. majo, junio, aestate.
972. SONCHUS *tenerrimus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1515.  
 Legi in pratis montanis *di Esino* supra *Varena*. Fl. aestate.
973. LACTUCA *sativa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1523.  
 Colitur in hortis. Fl. majo.

974. *LACTUCA virosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1526.

Reperi in aggeribus, et prope fossas in planitie di  
*Colico*. Fl. julio, agosto.

975. *LACTUCA perennis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1550.

Crescit in montibus Como vicinioribus, atque supra  
*il Sasso di Musso*. Fl. majo, junio.

976. *CHONDRILLA juncea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1551.

Habitat in locis arenosis sterilibus, atque in alveis  
torrentium. Fl. junio, julio.

977. *PRENANTHES purpurea* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1554.

Occurrit in sylvis montanis *Vallis Intelvi*, in pratis  
montis *Boletto* supra *Ponzate*, et alibi. Fl. junio,  
julio.

978. *PRENANTHES muralis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1545.

Abundat in locis umbrosis, in sylvis collinis, et etiam  
in planitie ad sepes. Fl. aestate.

979. *LEONTODON Taraxacum* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1544.

Oritur in pratis et pascuis ubique. Fl. vere, aestate.

980. *APARGIA alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1547.

Incolit montes editiores, *Legnone*, *Codeno*, in regio-  
ne alpina inferiori, et fl. julio, agosto.

981. *APARGIA crocea* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1548.

Obviam mihi venit in montibus *di Dongo*, *Vallis Sa-  
sina*, *Resegone*, *Codeno*, *Legnone* ec. Fl. julio, au-  
gusto.

982. APARGIA *hastilis* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1548.  
Frequens in pratis totius fere Provinciae. Fl. vere,  
aestate.
985. APARGIA *autumnalis* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1550.  
Reperitur cum praecedente in pratis, atque pascuis,  
et il. julio, augusto, autumno.
984. APARGIA *hispida* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1552.  
Nascitur in pascuis siccis arenosis praesertim collinis.  
Fl. vere, autumno.
985. HIERACHI *Mauricum* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1559.  
Mihi occurrit in pratis montis *Biandino* inter *Abietis*  
et *Mughi* regiones. Fl. julio, augusto.
986. HIERACIUM *Pilosella* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 1565.  
Habitat in locis aridis, atque ad margines agrorum  
in collibus apricis. Fl. vere, aestate.
987. HIERACIUM *dubium* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 1565.  
Inveni in sylvis monti *Generoso* subjectis, et legi flo-  
ridum junio, julio.
988. HIERACIUM *cymosum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 1566.  
Crescit in pratis montis *Generoso*. Fl. junio, julio.
989. HIERACIUM *piloselloides* Villars. Delph. T. 5.  
p. 100.  
Haec species mihi obviam venit in pratis siccis *della*  
*Valmeria* supra *Mandello*, ubi legi florentem augusto.
990. HIERACIUM *humile* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1575.  
H. *Jacquini* Villars. Delph. T. 5. p. 125. T. 28.

Legi in monte *Canzo a S. Miro* ad rupes. Fl. junio, julio.

991. *HIERACIUM porrifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3 p. 1575.

Provenit in locis saxosis aridis ad oras *Larii lacus, nelle Crosgalle*, atque in montibus *di Mandello, Griante ec.* Fl. julio, agosto.

992. *HIERACIUM murorum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1577.

Vulgare in muris, atque in locis aridis collium et montium. Fl. majo, junio, julio.

993. *HIERACIUM sylvaticum* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1578.

Habitat in sylvis collinis prope *Comum*, atque pagos *di Villa Albese et Erba*. Fl. junio, julio.

994. *HIERACIUM paludosum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1579.

Reperi in locis palustribus *a Colico*, atque in sylvis humidiusculis circa *Porlezza*. Fl. julio, agosto.

995. *HIERACIUM amplexicaule* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1582.

Crescit in montibus *Generoso* et *Canzo* ad limites regionis *Fagi*, et fl. junio, julio.

996. *HIERACIUM pyrenaicum* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1582.

ð. *H. austriacum* Jacq. vind. 270. T. 5. austr. T. 441.

Reperi in montibus editioribus *Vallis Sasina, Biantino, Pizzo dei tre Signori ec.* cum varietate ð. Fl. julio, agosto.

997. *HIERACIUM grandiflorum* Allion. fl. ped. N. 794. T. 29. f. 2. 3.

*H. grandiflorum* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1584.

Oritur in pratis montium *Generoso, Pizzo di Gino, Codeno ec.* a termino Fagi usque ad litem regionis subalpinae. Fl. junio, julio, agosto.

998. *HIERACIUM intybaceum* Jacq. austr. app. T. 17.

H. *intybaceum* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1585.

Decerpsi in monte *Biandino* in locis herbidis asperis regionem subalpinam attingentibus. Nunquam reperi in alis Provinciae montibus. Fl. julio, agosto.

999. *HIERACIUM villosum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1585.

Nascitur in pratis montium *Generoso, Pizzo di Gino, S. Jorio ec.* inter Fagi et Abietis regiones. Fl. junio, julio.

1000. *HIERACIUM sabaudum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1589.

Abundat ad oras sylvarum collium et montium circa *Comun*, et alibi. Fl. junio, julio, agosto.

1001. *HIERACIUM fallax* Willd. enum. p. 822.

Mihi occurrit in pascuis montis *Biandino* regioni Fagi superioribus, et legi floridum ineunte augusto anni 1825. Haecenus non vidi in aliis Provinciae montibus.

1002. *HIERACIUM prenanthoides* Villars. Delph. T. 3. p. 108.

H. *prenanthoides* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1590.

Provenit in montibus *Vallis Intelvi*, atque in sylvis circa *Comun*. Fl. julio, agosto, septembri.

1003. *HIERACIUM umbellatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1591.

Occurrit in sylvis et sepibus collinis, et etiam reperitur in pascuis siccis planitiei Fl. julio, augusto, septembri.

1004. *CREPIS alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1595.

Habitat in montibus fere omnibus Larii lacus. Fl. junio, julio.

1005. *CREPIS foetida* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1598.

Haud rara in locis aridis ad agrorum margines etiam circa Comum. Fl. aestate.

1006. *CREPIS tectorum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1601.

Oritur in pratis, et pascuis siccis, atque ad limites agrorum variis in locis. Fl. aestate.

1007. *CREPIS biennis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1605.

Communis est in pratis ubique. Fl. majo, junio, julio.

1008. *CREPIS hispida* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1601.

*Barkausia setosa* Decand. fl. fr. T. 4. p. 44. et 5. p. 450.

Obviam mihi venit in pratis di S. Giuseppe in Valleggio prope Comum, atque ad margines agrorum circa pagos di Canzo, et Asso. Fl. augusto, septembri.

1009. *HYPOCHOERIS helvetica* Murr. syst. veg. ed. 14. p. 721.

II. *helvetica* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1620.

Incolit prata montium editorum, Generoso, Pizzo di Gino, Aigua ec., et descendit aliquando usque ad regionem Fagi. Fl. junio, julio, augusto.



1010. HYPOCHOERIS *glabra* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1621.

Inveni in pratis Como vicinioribus, a Grandate, Lucino, ec. Fl. junio, julio.

1011. HYPOCHOERIS *radicata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1622.

Abundat in pratis ubique. Fl. junio, julio, agosto.

1012. LAPSANA *communis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1624.

Vulgatissima in sepibus, ruderatis, atque hortis ad muros. Fl. maio, junio, julio.

1013. CICHORIUM *Intybus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1628.

Crescit sponte ad margines agrorum permultis in locis.

Fl. aestate. Colitur etiam in omnibus hortis.

1014. CICHORIUM *Endivia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1629.

Excultur in hortis cum varietate  $\beta$  foliis crispis. Fl. aestate.

1015. ARCTIUM *Lappa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1631.

Nascitur in ruderatis, atque pratis humentibus ubique. Fl. aestate.

1016. SERRATULA *tinctoria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1638.

Reperitur in pratis montanis fere omnibus, atque in sylvis collinis etiam prope Comm. Variat foliis omnibus integris, et caule simplici. Fl. julio, agosto.

1017. SERRATULA *discolor* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1641.

*S. alpina*  $\gamma$  Linn. spec. pl. p. 1145.

Occurrit inter saxa ad cacumen montis *Generoso*, et  
fl. julio, augusto.

1018. *SERRATULA arvensis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 1646.

Frequens in agris ubique. Fl. junio, julio.

1019. *CARDUUS nutans* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 1648.

Communis in pratis sterilibus, ad vias, et in ruderatis.  
Fl. aestate.

1020. *CARDUUS montosus* Pollin. fl. veron. T. 5.  
p. 625.

*C. nutans*  $\beta$  Bertolon. Amoen. it. p. 40. et 404.

Collegi in pratis montis *Generoso* supra mapalia di  
*Orimento*. Fl. junio, julio, augusto.

1021. *CARDUUS Personata* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1651.

Reperi in Valle di *Menaggio* ad viam, quae ducit ad  
*Porlezza*, atque in locis umbrosis montium Vallis  
*Intelvi*. Fl. junio, julio.

1022. *CARDUUS defloratus* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 1657.

Habitat in pascuis montium *Generoso*, *Gordona*, *Dongo*,  
et Vallis *Cavargna*. Fl. junio, julio, augusto.

1023. *CARDUUS pannonicus* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 1658.

Obviam mihi venit in pratis montis *Generoso*. Fl.  
junio, julio.

1024. *CARDUUS transalpinus* Sutter. fl. helv. T. 2.  
p. 164.

*C. summanus* Pollin. fl. veron. T. 2. p. 628.

Decerpsi in pratis montium *Generoso*, et *Gordona* in  
Vall. *Intelvi* Fl. junio, julio.

1025. *CARDUUS marianus* Lann. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 1659.

Reperitur in nonnullis hortis, atque in ruderatis planioris Provinciae. Fl. mayo, junio.

1026. *CNICUS palustris* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1662.

Crescit in pratis humidiusculis, atque ad margines rivulorum tam in montibus et collibus, quam in planitie. Fl. aestate.

1027. *CNICUS lanceolatus* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1666.

Habitat in locis humentibus, ad vias, marginesque rivorum in collibus, atque in planitie. Fl. aestate.

1028. *CNICUS eriophorus* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1669.

Occurrit ad summitatem collis *Baradello*, atque in montibus *di Brunate*, *Civiglio* &c. Fl. aestate.

1029. *CNICUS heterophyllus* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1675.

Reperi secus rivulos in pratis subalpinis montis *S. Jorino*, et legi florentem augusto.

1030. *CNICUS Erisithales* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 1579.

Abundat in pratis omnium fere montium Provinciae, et in pascuis humentibus. Fl. aestate.

1031. *CNICUS spathulatus* Morett. Diar. phys. ec.  
ticin. Dec. 2. T. 5. p. 111.

Haec species, cujus descriptionem ab amico Professore *Morettio* jam adhibitam hic addere mihi libet, abundat in apricis prope pagos *di Brunate*, et *Civiglio*, et fl. augusto, septembri.

Radix illius est ramosa perpendicularis; caulis erectus, humanam altitudinem fere attingens, teres, sulcatus, plus minus tomentosus; foliis semiamplexicaulia, profunde pinnatifida, laciniis bipartitis linearilanceolatis, basi hinc inde spinosis, apice spinâ terminatis, margine ciliatis, subtus tomentosus; flores in summitate caulis solitarii; calices ovati subnulli, squammis nigrescentibus, spathulatis, apice spinulosis, margine membranaceis albidis.

1052. ONOPORDUM *Acanthium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1686.

Nascitur in locis arenosis, ad vias, atque in ruderalis planioris Provinciae. Fl. junio, julio, agosto.

1053. CYNARA *Cardunculus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1691.

Colitur in hortis. Fl. junio, julio.

1054. CYNARA *Scolymus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1691.

β. *C. hortensis aculeata*. Bauh. pin. 385.

γ. *C. hortensis foliis non aculeatis*. Bauh. pin. 385.

Varietates β et γ excoluntur in hortis. Fl. junio, julio.

1055. CARLINA *acaulis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1695.

Exstat in pascuis montanis et collinis cum varietate *caulescente*. Fl. junio, julio, agosto.

1056. CARLINA *vulgaris* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1696.

Vulgatissima in locis aridis montium, atque collium, et etiam in sylvis circa Comum. Fl. aestate.

1057. BIDENS *tripartita* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1715.

- Crescit in locis paludosis, atque ad margines fossarum planioris praesertim Provinciae, Fl. Augusto, septembri.
1058. *BIDENS cernua* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1716.  
Provenit in pratis uliginosis et turfosis, ad fossas, atque in paludibus. Fl. Augusto, septembri.
1059. *CACALIA alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1755.  
Oritur in piscinis montium *Generoso, Canzo, Coleno* regionem Abietis haud superantibus, et fl. Junio, Julio.
1060. *EUPATORIUM cannabinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1756.  
Abundat ad margines rivorum, atque in locis udis nubrosis ubique. Fl. Junio, Julio.
1061. *BALSAMITA vulgaris* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1802.  
Excolitur in hortis, ubi floret aestate.

## SUPERFLUA.

1062. *TANACETUM vulgare* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1814.  
Frequens est ad margines agrorum, ad fossas in locis humilioribus Provinciae, atque secus aquas lente fluentes. Vidi magnâ copiâ prope fluvium *Olona* circa pagos *di Torba* et *Castiglione*. Fl. Julio, Augusto, septembri.
1065. *ARTEMISIA Abrotanum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1818.  
Colitur in hortis. Fl. Julio, Augusto, septembri.

1044. ARTEMISIA *glacialis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1821.  
Legi in monte *Legnove* fere ad summitatem. Fl. julio,  
augusto.
1045. ARTEMISIA *campestris* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1827.  
Crescit in locis aridis collium, et etiam supra muros  
propugnaculorum urbis. Fl. augusto, septembri.
1046. ARTEMISIA *camphorata* Willd. spec. pl. T. 3.  
p. 1829.  
Reperitur ad rupes inter pagum *di Cernobbio* et *Pizzo*.  
Fl. augusto, septembri.
1047. ARTEMISIA *Absinthium* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1844.  
Abundat in Valle *Intelvi* praesertim in alveis tor-  
rentium, et in locis saxosis apricis. Fl. julio, au-  
gusto, septembri.
1048. ARTEMISIA *vulgaris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 1845.  
Communis est ad vias, et margines agrorum, atque  
in fossis ubique. Fl. julio, augusto, septembri.
1049. GNAPHALIUM *Stoechas* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1865.  
Abundat in arenosis prope pagos *di Olginate* et *Ca-  
lolzo*, et fl. julio, augusto.
1050. GNAPHALIUM *lutco-album* Linn. spec. pl.  
ed. Willd. T. 3. p. 1871.  
Nascitur in sylvis, atque ad vias in locis humentibus.  
Vulgatissima species circa pagum *di Bellagio*. Fl.  
julio, augusto, septembri.
1051. GNAPHALIUM *dioicum* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 3. p. 1882.

Oritur in montibus omnibus Provinciae, atque in erectis collibus circa Comum. Fl. junio, julio.

1052. GNAPHALIUM *sylvaticum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1884.

Obviam venit in sylvis, et pascuis montanis Vallis Intelva, di Solzago, Albese ec. Fl. junio, julio.

1053. GNAPHALIUM *supinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1888.

Inveniuntur in montibus di Dongo et Vallis Cavargna. Fl. junio, julio, agosto.

1054. GNAPHALIUM *uliginosum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1891.

Haud rarum in locis paludosis, atque in fossis montanae et planioris Provinciae. Fl. julio, agosto, septembri.

1055. GNAPHALIUM *Leontopodium* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1892.

Incolit montes editiores di Dongo, Lavo, Mandello, Cavargna ec., in quibus observatur a regione Abietis usque ad illam Mugli. Fl. julio, agosto.

1056. GNAPHALIUM *germanicum* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1894.

Vulgare in locis aridis tam collinis quam montanis. Fl. junio, julio, agosto.

1057. XERANTHEMUM *inapertum* Willd. spec. pl. T. 5. p. 1902.

Habitat in collibus aridis circa Comum. Ego legi in saxosis a Lucino loco dicto li Dossi. Fl. julio, agosto.

1058. CONYZA *squarrosa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 1918.

Frequens est in montibus *Como* vicinioribus, praesertim ad sepes circa pagos *di Brunate*, *Civiglio*, *Ponzate*, atque ad rupes *a Pizzo*, *Moltrasio* &c. Fl. julio, agosto.

1059. ERIGERON *canadense* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1954.

Nihil vulgatus in agris, atque in locis sterilibus totius Provinciae. Fl. julio, agosto.

1060. ERIGERON *Villarsii* Willd. spec. pl. T. 3. p. 1958.

Mihi occurrit in montibus editioribus *Vallis Cavargna*, *al Pizzo di Gino*, in *Aigua* &c. Fl. julio, agosto.

1061. ERIGERON *acre* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1959.

Habitat in locis aridis apricis collium et montium etiam prope *Comum*. Fl. julio, agosto.

1062. ERIGERON *alpinum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1959.

Crescit in montibus fere omnibus, et fl. julio, agosto.

1063. ERIGERON *uniflorum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1960.

Collegi in montibus *Laguone* et *S. Jorio* in pratis regionem subalpinam pertingentibus. Fl. julio, agosto.

1064. TUSSILAGO *alpina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1966.

Provenit in subhumidis pascuis montium fere omnium, et a regione *Fagi* usque ad subnivalem adscendit. Fl. junio, julio, agosto.

1065. TUSSILAGO *Farfara* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 1967.



Communis in locis argillosis humentibus, et secus  
aquas lente fluentes. Fl. primo vere.

1066. TUSSILAGO *alba* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 1969.*

Oritur in montibus Como vicinioribus, et in sylvis  
supra *S. Abbondio* secus rivulos, atque in locis  
umbrosis. Fl. martio, aprili, majo.

1067. TUSSILAGO *nivea* Willd. *spec. pl. T. 3.*  
*p. 1970.*

*T. frigida* Villars. *Delph. 3. p. 275.*

Obviam mihi venit secus rivos in montibus *di Man-*  
*dello*, atque alibi, superata Fagi regione. Fl. ju-  
nio, julio.

1068. TUSSILAGO *Petasites* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 1974.*

Nascitur in pratis humidis circa Comum, atque ad  
margines torrentium multis in locis. Fl. martio,  
aprili, majo.

1069. SENECIO *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 1979.*

Frequens est in hortis, atque in locis cultis ubique.  
Fl. primo vere.

1070. SENECIO *viscosus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 1984.*

Reperi fere ad summitatem *della Valmarz* prope pa-  
gum *di Lanzo* in Valle Intelvi. Fl. junio, julio.

1071. SENECIO *rupestris* Willd. *spec. pl. T. 3.*  
*p. 1989.*

*S. laciniatus* Bertolon. *Amoenit. ital. Dec. 4. p. 102.*

Mihi occurrit in pratis aridis, atque in rupibus mon-  
tis *Canzo*. Fl. junio, julio.

1072. *SENECIO incanus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 1995.

Inveni in montibus *Legnone, Generoso, Codeno, Canzo, Pizzo di Gino*, et alibi a regione *Abietis* usque ad *limitem Mugli*. Fl. julio, agosto.

1073. *SENECIO abrotanifolius* Linn. *spec. pl. ed. Willd.* T. 5. p. 1995.

Legi in pratis subalpinis montium *Legnone, Generoso, Codeno, Biandino, S. Jorio, Pizzo di Gino ec.* Fl. julio, agosto.

1074. *SENECIO Jacobea* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 1997.

Oritur in pratis et pascuis montanis ac collinis etiam prope *Comum*. Fl. junio, julio.

1075. *SENECIO aquaticus* Hudson. *Angl.* 366.

*S. erraticus Bertolon. Amoen. ital. Dec.* 5. p. 92.

Crescit in pratis humidis prope *Comum*. Fl. majo, junio.

1076. *SENECIO paludosus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 2002.

Provenit in locis palustribus, atque ad *marginem torrentium et rivorum*. Fl. junio, julio, agosto.

1077. *SENECIO saraccenicus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 2005.

Obviam venit in sylvis et sepibus collinis ac montanis etiam prope *Comum*. Fl. junio, julio.

1078. *SENECIO Doronicum* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
T. 5. p. 2006.

Habitat in regione subalpina montium *Generoso, Pizzo di Gino, Legnone, Codeno ec.* Fl. junio, julio.

1079. ASTER *alpinus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2018.

Mihi occurrit in pascuis aridis montium Lari lacus, a S. Jorio, in Bellorona, et etiam in pratis alpis Legnone, atque in montibus humilioribus Como imminentibus. Fl. junio, julio.

1080. ASTER *Amellus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2051.

Vulgaris ad margines agrorum collium urbi viciniorum, a Geno, S. Agostino, Garzola ec. Vidi etiam in muris propugnaculorum urbis. Fl. julio, agosto, septembri.

1081. ASTER *annuus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2041.

Communis est in campis, in pratis, atque in herbosis propugnaculorum urbis. Fl. junio, julio.

1082. SOLIDAGO *Virgaurea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2065.

Abundat in collibus ac montibus, et etiam reperitur in dumetis planioris Provinciae. Fl. julio, agosto.

1083. SOLIDAGO *minuta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2067.

Nascitur in montibus *Bianlino* et *Codeno*, atque in in prato dicto *Campo dei fiori* supra *la Madonna del monte di Varese*. Fl. julio, agosto.

1084. CINERARIA *aurantiaca* Willd. spec. pl. T. 3. p. 2081.

Provenit copiose ad summitatem montis *Generoso*, et fl. juni, julio.

1085. CINERARIA *cordifolia* Willd. spec. pl. T. 3. p. 2085.

Vidi et collegi in pascuis et locis humentibus Vallis  
*Intelvi* et *Valmeria*. Fl. julio, agosto.

1086. CINERARIA *integrifolia* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 2082.

Obviam mihi venit in pascuis subalpinis montium *di*  
*Dongo*, *Livo*, atque *Bellorona*. Fl. julio, agosto.

1087. INULA *dysenterica* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 2091.

Reperitur copiose in locis humidis paludosis, atque  
ad fossas, marginesque rivorum. Fl. junio, julio.

1088. INULA *Pulicaria* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 2093.

Oritur in pascuis humentibus, atque in locis uligi-  
nosis planioris Provinciae. Fl. julio, agosto.

1089. INULA *salicina* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 2096.

Haud rara est in collibus apricis, et sylvis montanis  
Como vicinioribus. Fl. junio, julio, agosto.

1090. INULA *hirta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.  
p. 2098.

Frequens in collibus atque montibus circa *Comum*;  
et alibi. Fl. junio, julio.

1091. ARNICA *montana* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 2106.

Provenit in pratis montium fere omnium, et etiam in  
pascuis collinis Como vicinioribus. Fl. junio, julio.

1092. ARNICA *scorpioides* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 3. p. 2108.

Mihi obviam venit inter rupes sole fere invisas in  
regione subalpina montis *Codeno* ex parte *Mandello*  
obversa, atque in *Valmeria* inter saxa ad nivem de-  
liquescentem. Fl. julio, agosto.

1093. ARNICA *Doronicum Willd. spec. pl. T. 3.*  
p. 2108.

Inveni in montibus *Legnone*, et *Codeno* fere ad illorum summitatem. Fl. julio, agosto.

1094. ARNICA *Bellidiartrum Willd. spec. pl. T. 3.*  
p. 2109.

Habitat in montibus fere omnibus, et etiam in humilioribus prope *Comum*, uti a *S. Maurizio* supra *Brunate* atque ad *Boletto*. Fl. junio, julio, agosto.

1095. DORONICUM *Pardalianches Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2113.*

Occurrit ad sepes in umbrosis collinis circa *Comum*, a *S. Abbondio*, *Maslianico* atque in sylvis montanis *Vallis Intelvi*. Fl. junio, julio.

1096. BELLIS *perennis Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3.*  
p. 2121.

Communis in pratis et pascuis siccis. In hortis colitur *var. fl. pl.* Fl. primo vere.

1097. CHRYSANTHEMUM *Leucanthemum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2142.*

Vulgatissimum in pratis omnibus tam montanis quam planis. Fl. a majo ad julium. Hujus speciei dantur multae *varietates*.

1098. CHRYSANTHEMUM *montanum Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2143.*

Mihi obviam venit in pratis montanis *di Esino* atque *della Valmeria*, et decerpsi floridum julio, agosto.

1099. CHRYSANTHEMUM *coronarium Willd. spec. pl. T. 3. p. 2149.*

Colitur in hortis. Fl. aestate.

1100. PYRETHRUM *alpinum Willd. spec. pl. T. 3.*  
p. 2153.

Crescit in montibus *Legnone, Codeno, S. Jorio, Pizzo di Gino* ec. Fl. julio, agosto.

1101. PYRETRUM *corymbosum* Willd. *spec. pl. T. 3. p. 2155.*

Abundat in sylvis, et pascuis collinis ac montanis, etiam prope *Comum*. Fl. majo, junio, julio.

1102. PYRETRUM *Parthenium* Willd. *spec. pl. T. 3. p. 2155.*

Species et *varietas flore pleno* excoluntur in hortis. Fl. majo, junio, julio.

1103. MATRICARIA *Chamomilla* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2161.*

Colitur in hortis, et sponte crescit inter segetes planioris praesertim *Provinciae*. Fl. aestate.

1104. ANTHEMIS *Cota* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2174.*

Reperitur in arvis praesertim collinis inter segetes. Fl. majo, junio.

1105. ANTHEMIS *arvensis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2180.*

Frequens in arvis ubique. Fl. junio, julio.

1106. ANTHEMIS *tinctoria* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2189.*

Haud rara in arvis collinis *della Brianza*, et circa *Comum*. Fl. aestate.

1107. ACHILLEA *Clavennae* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2195.*

Provenit ad cacumina montium *Generoso, S. Jorio, Ajgua, Pizzo di Gino* ec. Fl. julio, agosto.

1108. ACHILLEA *atrata* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2200.*

Habitat in montibus di *Livo* atque Vallis *Cavargna* in regione *Mughi*. Fl. julio, agosto.

1109. *ACHILLEA moschata* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2201.

Invenitur in monte *Legnone*, atque all'Alpe di *Aren-go* supra *Livo* prope regionem subniviosam. Fl. julio, agosto.

1110. *ACHILLEA nana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2201.

Legi ad summitatem montis *Legnone*. Fl. julio, agosto.

1111. *ACHILLEA macrophylla* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2204.

Occurrit mihi in montibus fere omnibus *Larii* lacus a termino *Fagi* usque ad regionem subalpinam. Fl. julio, agosto.

1112. *ACHILLEA magna* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2208.

Crescit in pratis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavargna* ec. Fl. junio, julio, agosto.

1113. *ACHILLEA Millefolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2208.

Abundat in pratis totius Provinciae. Fl. majo, aestate.

1114. *BUPHTHALMUM salicifolium* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2254.

Commune in collibus, atque in montibus humilioribus Provinciae. Fl. junio, julio.

1115. *BUPHTHALMUM speciosissimum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 3. p. 2255.

Haec species copiose invenitur in saxosis montium di *Bellagio*, *Canzo*, *Mandello*, *Resegone*, *Codeno*, et etiam nelle *Crosgalle* fere ad oras lacus inter pagos *Bellagio* et *Iezzeno*. Fl. junio, julio, agosto.

## FRUSTRANEA.

1116. *CENTAUREA phrygia* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 2282.*  
 Obviam mihi venit in pratis subalpinis montis *Legnone*. Fl. julio, agosto.
1117. *CENTAUREA uniflora* Linn. *mant. Willd.*  
*spec. pl. T. 3. p. 2285.*  
 Legi cum praecedente in monte *Legnone* regione *Abietis* vix superata. Fl. julio, agosto.
1118. *CENTAUREA nigrescens* Willd. *spec. pl. T. 3.*  
*p. 2288.*  
 Frequens in pratis etiam planioris Provinciae. Fl. aestate.
1119. *CENTAUREA montana* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 2290.*  
 Habitat in pratis, atque pascuis montium totius fere Provinciae, et raro ultra terminum *Fagi* se extendit. Fl. junio, julio.
1120. *CENTAUREA Cyanus* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 2291.*  
 Vulgatissima in arvis inter segetes. Fl. majo, junio.
1121. *CENTAUREA Scabiosa* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 2296.*  
 Nascitur in pratis et pascuis collinis ac montanis etiam circa *Comum*. Fl. junio, julio, agosto.
1122. *CENTAUREA amara* Linn. *sp. pl. ed. Willd.*  
*T. 3. p. 2303.*  
 Frequens in collibus, et montibus Provinciae humilioribus. Oritur etiam in locis siccis planitiei. Fl. aestate.
1123. *CENTAUREA splendens* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 3. p. 2304.*



Crescit in collibus *Como* vicinioribus, ad arcem *Baradello*, *al Ponte Molinello*, et alibi. Fl. junio, julio, agosto.

1124. CENTAUREA *Rhapontica* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 2505.

Legi anno 1825 fere ad cacumen meridionale montis *Codeno* julio exeunte, et reperi elapsa aestate copiose inter saxa ad vertices *della Falmeria* supra *Mandello*. Fl. julio, agosto.

1125. CENTAUREA *Calcitrapa* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 2517.

Oritur copiose in ruderatis, atque in locis aridis glareosis praesertim secus torrentes. Fl. junio, julio.

1126. HELIANTHUS *annuus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 2257.

Excolitur in hortis, ubi fl. aestate.

1127. HELIANTHUS *tuberosus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 2259.

Olim colebatur in hortis, atque in arvis, sed nunc ejus loco scribitur *Solanum tuberosum*, et solum in nonnullis viridariis ornamenti causâ educatur. Fl. aestate.

#### NECESSARIA.

1128. CALENDULA *officinalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 2540.

Colitur in hortis cum *varietate flore pleno*, et fl. aestate.

1129. ECHINOPS *sphærocephalus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 2596.

Mihi occurrit circa pagum *di Canzo* in loco glareoso. Fl. julio, agosto.

## CL. XX. GYNANDRIA.

## MONANDRIA.

1150. **O**RCHIS *bifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 10.  
Provenit in sylvis montanis prope Comum, a *Garzola*,  
*S. Martino* ec. Fl. majo, junio.
1151. ORCHIS *globosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 14.  
Reperitur in pratis montium *Generoso*, *Canzo*, *Bo-*  
*letto* ec. Fl. junio, julio.
1152. ORCHIS *pyramidalis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 14.  
Crescit in pratis montanis humentibus, praesertim in  
Valle *Intelvi*. Fl. majo, junio.
1153. ORCHIS *coriophora* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 16.  
Inveni in prato *Lanificio di S. Martino* viciniore,  
atque in pascuis supra pagos *di Civiglio* et *Pon-*  
*zate*. Fl. majo.
1154. ORCHIS *Morio* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 18.  
Frequens in pratis, atque in sylvis etiam circa Comum.  
Fl. majo, junio.
1155. ORCHIS *mascula* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 18.  
Abundat in pratis montanis et collinis *Como* propio-  
ribus. Fl. majo, junio.

1156. ORCHIS *ustulata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 20.

Habitat in pratis collinis humentibus, atque in pascuis montium *Como* viciniorum. Fl. majo, junio.

1157. ORCHIS *variegata* Jacq. Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 21.

Incolit prata montana lacus *Larii*, atque Vallium *Carvagna*, et *Intelvi*. Fl. majo, junio.

1158. ORCHIS *militaris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 22.

Occurrit in pratis collinis et montanis etiam prope *Comum*. Fl. majo.

1159. ORCHIS *papilionacea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 24.

Mihi obviam venit in pratis montis *Canzo*. Fl. majo, junio.

1140. ORCHIS *ensifolia* Willd. spec. pl. T. 4. p. 25.  
*O. laxiflora* Lam. Fl. fr. 5. p. 504.

Legi in pratis et pascuis montium *di Griante*, *Tremezzo*, *Dongo* ec. Fl. junio.

1141. ORCHIS *incarnata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 30.

Decerpsi in pascuis montanis et collinis *della Tremezzina*. Fl. junio.

1142. ORCHIS *maculata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 31.

Communis est in pratis et pascuis collinis ac montanis. Fl. majo, junio.

1143. ORCHIS *odoratissima* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 32.

Haud rara est in pascuis editioribus montium *Larii* lacus. Fl. junio, julio.

1144. ORCHIS *conopsea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 52.  
Invenitur in pratis montanis Vallis Intelvi, Canzo,  
Mandello ec. Fl. junio, julio.
1145. ORCHIS *nigra* Willd. spec. pl. T. 4. p. 55.  
Satyrium *nigrum* Linn. spec. pl. p. 1538.  
Habitat in montibus Vallis Intelvi, Canzo, S. Primo,  
Generoso ec. Fl. majo, junio.
1146. OPHRYS *Monorchis* Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 61.  
Reperi in pratis montium Vallis Intelvi, Lecco, Gor-  
dona, S. Bernardo supra Carate, et etiam prope  
Comum in quodam pascuo Lanificio di S. Martino  
viciniore. Fl. majo, junio.
1147. OPHRYS *anthropophora* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 4. p. 65.  
Crescit in pratis valleculae di S. Martino prope  
Comum. Fl. majo.
1148. OPHRYS *myodes* Willd. spec. pl. T. 4. p. 64.  
O. *insectifera* & *myodes* Linn. spec. pl. p. 1545.  
Provenit in pratis, et pascuis collinis prope Comum  
supra S. Martino, a Stimianico ec. Fl. majo.
1149. OPHRYS *aranifera* Willd. spec. pl. T. 4. p. 66.  
Invenitur sed raro in pratis collinis Como viciniori-  
bus. Fl. majo.
1150. SERAPIAS *Lingua* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 70.  
Frequens in pratis, atque ad margines agrorum her-  
bidos collium circa Comum, Erba, Griante, ec.  
Fl. majo.
1151. NEOTTIA *spiralis* Willd. spec. pl. T. 4. p. 73.

Crescit in locis arenosis herbidis collium prope Comum,  
*a Carlano, Garzola, Stumianico, Rovenna ec.*  
 Fl. augusto, septembri.

1152. *EPIPACTIS latifolia Willd. spec. pl. T. 4.*  
*p. 83.*

Occurrit in sylvis montanis etiam Como vicinioribus.  
 Fl. junio, julio.

1153. *EPIPACTIS palustris Willd. spec. pl. T. 4.*  
*p. 84.*

Habitat in pratis uliginosis collinis, et in pascuis udibus  
 prope *Cernobbio, Maslianico ec.* Fl. aestate.

1154. *EPIPACTIS ensifolia Willd. spec. pl. T. 4.*  
*p. 85.*

Incolit sylvas umbrosas collium totius fere Provinciae.  
 Fl. majo, junio.

1155. *EPIPACTIS rubra Willd. spec. pl. T. 4. p. 86.*

Mihi obviam venit in sylvis prope pagos *di Laglio,*  
*et Brienzo.* Fl. julio.

1156. *EPIPACTIS ovata Willd. spec. pl. T. 4. p. 87.*

Frequens est in sylvis et pratis omnium fere montium  
 Provinciae. Fl. majo, junio.

1157. *LIMODORUM abortivum Willd. spec. pl. T. 4.*  
*p. 129.*

*Orchis abortiva Linn. spec. pl. 1336.*

Reperi in sylvis umbrosis *di Rovenna* versus pagum  
*di Moltrasio.* Fl. majo, junio.

#### HEXANDRIA.

1158. *ARISTOLOCHIA longa Linn. spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 4. p. 159.*

Inveni ad margines agrorum herbidos in pago *Val-*  
*grehentino* prope *Olginate.* Fl. majo.

174 GYNANDRIA HEXANDRIA.

1159. ARISTOLOCHIA *rotunda* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 162.*

Crescit in arvis et dumetis collinis prope Commun.  
Fl. aprili, majo.

1160. ARISTOLOCHIA *pallida* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 162.*

*A. rotunda*  $\beta$  Linn. *spec. pl. 1564.*

Crescit in sylvis Como vicinioribus prope *Garzola*,  
et fl. majo.

1161. ARISTOLOCHIA *Clematidis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 163.*

Provenit copiose in ruderatis, in sylvis, atque in  
dumetis praesertim montanis. Fl. aprili, majo.

CL. XXI. MONOECIA.

MONANDRIA.

1162. ZANNICHELLA *palustris* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 181.*

Habitat in fossis, atque fluviis, et fl. aprili, majo.

1163. CHARA *vulgaris* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 185.*

Crescit in fossis et aquis lente fluentibus. Fl. junio,  
julio.

DIANDRIA.

1164. LEMNA *trisulca* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 195.*

Invenitur in aquis lente fluentibus puris. Fl. majo.

1165. *LEMNA minor* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 194.

Oritur in fossis et aquis stagnantibus ubique. Fl. majo,  
junio.

1166. *LEMNA polyrhiza* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 195.

Provenit in locis paludosis, atque in aquis pigris.  
Fl. majo, junio.

### TRIANDRIA.

1167. *TYPHA latifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 197.

Nascitur in locis paludosis a *Porlezza*, *Colico*, alibi-  
que. Fl. junio, julio.

1168. *SPARGANIUM ramosum* Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 199.

*S. erectum* Linn. spec. pl. 1578.

Occurrit in aquis stagnantibus, atque in fossis. Fl.  
junio, julio.

1169. *SPARGANIUM simplex* Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 199.

*S. erectum*  $\beta$  Linn. spec. pl. 1578.

Habitat in fossis, atque in palustribus locis. Fl. julio,  
augusto.

1170. *ZEA Mays* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 200.

Colitur magnâ copiâ in campis totius Provinciae.  
Fl. junio, julio.

1171. *CAREX Davalliana* Smith. Willd. spec. pl.  
T. 4. p. 208.

Crescit in pratis udis prope Comum, atque in aliis  
Provinciae locis in pascuis spongiosis. Fl. majo, junio.

1172. CAREX *baldensis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 216.

Reperi satis copiose in monte di Griante, fere ad  
oras Larii lacus nelle Crosgalle inter pagos Lezzeno  
et Bellagio, ac decerpsi etiam in montibus Codeno,  
Resegone, atque in pratis aridis montosis di Man-  
dello. Fl. aprili, majo in locis humilioribus, et  
junio, julio in subalpinis.

1173. CAREX *ovalis* Willd. spec. pl. T. 4. p. 229.  
Nascitur in pratis uliginosis planioris Provinciae. Fl.  
majo, junio.

1174. CAREX *stellulata* Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 256.

Invenitur in pascuis humidis praesertim prope Comum,  
all'Acqua negra, al Bassone. Fl. majo.

1175. CAREX *remota* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 259.

Abundat in pratis humentibus planitiei, et fl. majo.

1176. CAREX *paniculata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 244.

Provenit in pratis humidis atque in paludibus ple-  
risque in locis. Fl. majo.

1177. CAREX *digitata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 256.

Mihi obviam venit in sylvis umbrosis montium di  
Valle Intelvi, Bellagio, Dongo ec. Fl. junio.

1178. CAREX *collina* Willd. spec. pl. T. 4. p. 260.  
Habitat in nemoribus montanis et collinis plerisque  
in locis. Fl. junio.



1179. CAREX *praecox* Willd. spec. pl. T. 4. p. 262.  
Frequens in collibus circa Comum, et alibi. Fl. aprili,  
majo.
1180. CAREX *flava* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 268.  
Haud rara in pratis humentibus planioris praesertim  
Provinciae. Fl. junio, julio.
1181. CAREX *distans* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 271.  
Communis in pratis, atque pascuis collium et pla-  
nitiei. Fl. majo, junio.
1182. CAREX *Michelii* Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 277.  
Reperi in sylvis prope *Cardano* supra suburbium *di*  
*Vico*. Fl. majo, junio.
1183. CAREX *pilosa* Willd. spec. pl. T. 4. p. 278.  
Oritur in sylvis montium urbi imminentium. Fl.  
aprili, majo.
1184. CAREX *coespitosa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 287.  
Crescit in paludibus *di Breggia* prope Comum, *di*  
*Colico*, *Porlezza*, *Brabbia* prope *Varese*, atque  
in aliis pratis humentibus Provinciae. Fl. majo,  
junio.
1185. CAREX *stricta* Willd. spec. pl. T. 4. p. 287.  
Occurrit in locis paludosis circa Comum, *in Breggia*,  
*al Bassoue*. Fl. majo, junio.
1186. CAREX *Agastachys* Linn. suppl. 414.  
*C. pendula* Willd. spec. pl. T. 4. p. 288.  
Provenit in locis udis sylvaticis prope Comum. Fl.  
majo, junio.

1187. CAREX *Pseudo-Cyperus* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 295.  
Nascitur in fossis circa Comum, in Breggia, et alibi.  
Fl. majo, junio.
1188. CAREX *recurva* Willd. spec. pl. T. 4. p. 298.  
*C. glauca* Scopoli. Fl. carn. n. 1157.  
Reperitur in pratis turfosis di Cernobbio, Breggia ec.  
Fl. majo, junio.
1189. CAREX *acuta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 304.  
Frequens in fossis praesertim planioris Provinciae.  
Fl. aprili, majo.
1190. CAREX *paludosa* Willd. spec. pl. T. 4. p. 305.  
Habitat in locis palustribus Como vicinioribus, atque alibi. Fl. majo, junio.
1191. CAREX *riparia* Willd. spec. pl. T. 4. p. 306.  
Vulgaris est in fossis, in ripis torrentium, atque in locis palustribus di Colico, Portezza, et Brivio.  
Fl. majo, junio.
1192. CAREX *vesicaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 367.  
Oritur in palustribus sylvaticis prope Comum, a Cernobbio, Montorfano, all'Acqua negra, et alibi.  
Fl. majo, junio.
1193. CAREX *firma* Host. Gram. austr. 1. t. 75.  
Decerpsi in monte di Griante. Fl. majo, junio.
1194. CAREX *hirta* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 311.  
Crescit in pratis sabulosis humidiusculis pluribus in locis. Fl. junio.

## TETRANDRIA.

1195. ALNUS *glutinosa* Willd. *spec. pl. T. 4.*  
*p. 554.*

Frequens in sylvis humidiusculis, atque ad rivos  
ubique. Fl. aprili.

1196. ALNUS *incana* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 555.*

Reperitur in sylvis montanis Larii lacus, Vallis *In-*  
*telvi ec.* Fl. aprili, majo.

1197. BUXUS *sempervirens* Willd. *spec. pl. T. 4.*  
*p. 557.*

Occurrit multis in Provinciæ locis, etiam circa  
Comum præsertim in sepibus. Fl. aprili, majo.

1198. URTICA *urens* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4.*  
*p. 552.*

Abundat ad muros, atque in locis incultis ubique. Fl.  
junio.

1199. URTICA *dioica* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4.*  
*p. 552.*

Vulgatissima in locis incultis, atque in ruderatis ubique.  
Fl. junio.

1200. MORUS *alba* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4.*  
*p. 568.*

Colitur in campis magnâ copiâ in omni fere Provincia.

## PENTANDRIA.

1201. XANTHIUM *Strumarium* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 4. p. 575.*

Reperi in sabulosis a Gera, Colico, atque secus vias  
prope Mantello et Lecco. Fl. julio, agosto.

1202. AMARANTHUS *Blitum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 387.

Nascitur in cultis, secus vias, ad muros etiam in urbe, et fl. julio, agosto.

1203. AMARANTHUS *sylvestris* Desfontaine. catal. Hort. par. 44.

A. *viridis* Allioni. fl. ped. T. 2. p. 218.

Obviam mihi venit ad margines agrorum circa Comum, a S. Agata ec. Fl. julio, agosto.

1204. AMARANTHUS *ascendens* Loisel. Notic. p. 141.

Frequens in ambulacris extra moenia urbis. Fl. julio, agosto.

1205. AMARANTHUS *retroflexus* Willd. spec. pl. T. 4. p. 591.

Communis in arvis, atque secus vias circa Comum, et alibi. Fl. julio, agosto.

#### POLYANDRIA.

1206. CERATOPHYLLUM *demersum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 405.

Habitat sub aqua in fossis a S. Giuseppe prope Comum, in Breggia, et alibi. Fl. junio, julio.

1207. MYRIOPHYLLUM *spicatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 406.

Crescit in aquis lente fluentibus variis in locis. Fl. junio, julio.

1208. MYRIOPHYLLUM *verticillatum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 407.

Occurrit in locis paludosis et inundatis prope Cernobbio, Porlezza, Colico ec. Fl. junio, julio.

1209. SAGITTARIA *sagittifolia* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 408.*

Abundat in paludibus di Colico, et fl. julio, augusto.

1210. POTERIUM *Sanguisorba* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 421.*

Abundat ad margines agrorum herbidos praesertim in collibus. Fl. majo, junio.

1211. QUERCUS *Ilex* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 455.*

β. *Quercus Smilax foliis oblongo-ovatis subtus tomentosis integerrimis* Roy. *Lugd. Bat. 18.*

Species cum varietate provenit inter saxa a Nesso, atque al Dosso di Abido prope Lenno. Fl. majo.

1212. QUERCUS *Robur* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 450.*

*Q. sessiliflora* Smith. *Fl. brit. 3. p. 1026.*

α. *Q. glomerata* Decand. *Fl. fr. t. 3. p. 510.*

β. *Q. platyphylla* Decand. *Fl. fr. l. c.*

γ. *Q. laciniata* Decand. *Fl. fr. l. c.*

ε. *Q. lanuginosa* Thuil. *Fl. par. II. 1. p. 502.*

ζ. *Q. fastigiata* Lam. *Dict. 1. p. 725.*

Species nascitur in sylvis totius Provinciae, et varietates observantur variis in locis praesertim prope pagos di Asso, Canzo, Valmadrera, Lecco. Ego plures ex iis, uti α. β. γ., collegi in nemoribus di Canzo, et Lecco. Fl. aprili, majo,

1213. QUERCUS *pedunculata* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 450.*

*Q. racemosa* Lam. *Dict. 1. p. 715.*

Communis est in nemoribus totius Provinciae. Fl. aprili, majo.

1214. QUERCUS *pubescens* Willd. spec. pl. T. 4.  
p. 451.

Reperitur in nemoribus collium et montium. Fl. majo.

1215. QUERCUS *Cerris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 454.

Oritur in sylvis montanis Vallium Intelvi, Assina,  
di Mandello ec. Fl. majo, junio.

1216. JUGLANS *regia* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 455.

β. Nux *Juglans fructu maximo* Bauh. pin. 417.

Arbor exotica nunc sponte crescit ad oras sylvarum,  
in locis incultis collinis et montanis, atque colitur  
in praediis ad oleum ex fructibus exprimendum.  
Fl. majo.

1217. FAGUS *sylvatica* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 459.

Frequens in sylvis montanis. Fl. aprili, majo.

1218. CASTANEA *vesca* Willd. spec. pl. T. 4. p. 460.

Abundat in sylvis collinis et montanis, et colitur  
etiam in planiori Provincia. Fl. majo.

1219. BETULA *alba* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 462.

Abundat in montanis locis sterilibus. Fl. majo.

1220. BETULA *ovata* Willd. spec. pl. T. 4. p. 465.

Reperitur haud raro in locis arenosis humidiusculis  
montium Larii lacus, et in monte Generoso. Fl.  
aprili, majo.

1221. BETULA *nana* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 465.

Habitat in locis humentibus subalpinis montis Legno-  
ne. Fl. junio, julio.

1222. *CARPINUS Betulus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 467.  
Crescit in sylvis collinis et montanis ubique. Fl. majo,  
junio.
1223. *OSTRYA vulgaris* Willd. spec. pl. T. 4. p. 469.  
Reperitur in montibus Vallis Intelvi, et alibi. Fl.  
majo, junio.
1224. *CORYLUS Avellana* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 470.  
Vulgatissima in sepibus, atque in sylvis collium et  
montium. Fl. aprili, majo.
1225. *PLATANUS orientalis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 4. p. 475.  
Colitur in hortis, atque in ambulaeris. Fl. majo, junio.
1226. *ARUM italicum* Willd. spec. pl. T. 4. p. 484.  
Habitat ad sepes copiose circa Comum, atque prope  
pagos di *Lezzeno*, *Nesso*, *Argegno*, et alibi. Fl.  
aprili, majo.
1227. *ARUM maculatum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 485.  
Occurrit in locis umbrosis montium Como imminen-  
tium, et alibi. Fl. majo, junio.

MONADELPHIA.

1228. *PINUS sylvestris* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 494.  
Crescit in multis Provinciae partibus, et constituit  
lucos a *Gironico*, *Appiano*, *Trudate*, *Bellagio* cc.  
Fl. majo.
1229. *PINUS Mughus* Willd. spec. pl. T. 4. p. 495.  
Provenit in montibus editioribus Larii lacus, uti  
*Legnone*, *Pizzo di Gino* cc. Fl. junio, julio.

1250. PINUS *Larix* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 505.

Species haec olim vulgatissima erat in montibus Vallium *Cavargna*, *Sasina*, *Livo*, et *Legnone*, et nemora satis ampla constituebat; nunc valde imminuta est. Fl. majo, junio.

1251. PINUS *Picea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 504.

Nascitur in montibus altis *Larii* lacus, Valliumque *Cavargna*, et *Sasina*. Fl. majo, junio.

1252. PINUS *Abies* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4.  
p. 506.

Incolit eosdem montes ac praecedens species, et floret eodem tempore.

1253. RICINUS *communis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 564.

Colitur in nonnullis hortis praesertim a pharmacopolis in multis Provinciae locis. Fl. junio.

1254. CUCURBITA *lagenaria* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 4. p. 606.

Colitur ab agricolis ad lagenas praecipue conficiendas. Fl. aestate.

1255. CUCURBITA *Pepo* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 609.

Colitur ad usus culinares in hortis, in arvis. Fl. aestate.

1256. CUCUMIS *sativus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 615.

Colitur in hortis olitoriis, et etiam in campis circa Comm. Fl. aestate.

1257. BRYONIA *dioica* Willd. spec. pl. T. 4. p. 621.  
Oritur in sepibus. Fl. majo, junio.



## CL. XXII. DIOECIA.

## DIANDRIA.

1238. **V**ALLISNERIA *spiralis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 650.*

Nascitur in fossis, atque in aquis lente fluentibus in variis planioris Provinciae locis. Fl. junio.

1239. SALIX *triandra* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 654.*

Habitat in sabulosis ad flumina, atque torrentes, et fl. majo, junio.

1240. SALIX *vitellina* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 668.*

Colitur in pratis humentibus ad fossas. Fl. majo, junio.

1241. SALIX *corruscans* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 681.*

*S. Arbuscula* Jacq. *aust. t. 408. Host. synop. 527.*

Reperi in montibus *Generoso*, atque *Vallis Cavargna* ad rupes. Fl. junio.

1242. SALIX *herbacea* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 682.*

Inveni fere ad summitatem montis *Legnone*, et legi florentem julio.

1243. SALIX *retusa* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 684.*

Mihi occurrit in regione subalpina montium *Vallis Cavargna* ad rupes, ubi decerpsi florentem junio.

1244. SALIX *reticulata* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 685.*

- Mihi obviam venit ad cacumen montis *Legnone*. Fl. julio, agosto.
1245. *SALIX lapponum* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 689.  
 Inveni in montibus *Generoso* et *Legnone* a regione *Abietis* usque ad terminum *Mughi*. Fl. junio, julio.
1246. *SALIX arenaria* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 689.  
*S. helvetica* Vill. Delph. T. 3. p. 785.  
 Habitat in montibus editioribus *Vallis Cavargna*, *Pizzo di Gino*, et *Legnone*. Fl. junio, julio.
1247. *SALIX rosmarinifolia* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 697.  
 Crescit in alveis torrentium *Pioverna* in *Valle Sasina*, et *Caldone* supra *Lecco*. Fl. majo.
1248. *SALIX caprea* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 705.  
 Frequens est in sepibus, atque in sylvis siccis. Fl. aprili, majo.
1249. *SALIX aurita* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 700.  
 Haud rara in nemoribus et sylvis udis circa *Comum*. Fl. majo, junio.
1250. *SALIX viminalis* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 706.  
 Abundat ad ripas torrentium et fluviorum. Fl. majo, junio.
1251. *SALIX alba* Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 710.  
 Colitur ubique in *Provinciae pratis*, atque secus torrentes et aquas lente fluentes. Fl. majo.

## TRIANDRIA.

1253. *EMPETRUM nigrum* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 715.  
Habitat in locis udis montium *Legnone*, et *Codeno*.  
Fl. julio, augusto.

## TETRANDRIA.

1255. *VISCUM album* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 757.  
Species parasitica reperitur in Valle *Intelvi*, atque  
in aliis Provinciae montibus super *Sorbum Aucu-*  
*pariam*, *Quercum pedunculatam* et *sessilifloram*,  
atque *Pyrum Ariam*. Fl. julio, augusto.
1254. *HIPPOPHAEË Rhamnoides* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 4. p. 745.  
Provenit in alveo torrentis *Pioverna* in Valle *Sasina*,  
atque secus *Abduam a Colico*. Fl. majo, junio.
1255. *SPINACIA oleracea* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 766.  
Colitur in hortis olitoriiis totius Provinciae. Fl. majo,  
junio.
1256. *CANNABIS sativa* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 768.  
Excolitur in campis totius Provinciae. Fl. junio.
1257. *HUMULUS Lupulus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 769.  
Frequens in sepibus et dumetis ubique. Fl. junio, julio.
1258. *TAMUS communis* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 772.

Abundat in sepibus, atque in sylvis umbrosis. Fl. majo, junio.

1259. *POPULUS alba* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 802.*

Habitat in sylvis umbrosis udis, et etiam in nemoribus montanis. Fl. martio, aprili.

1260. *POPULUS tremula* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 803.*

Occurrit in sylvis udis praesertim collinis. Fl. martio, aprili.

1261. *POPULUS nigra* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 804.*

Crescit ad ripas torrentium, atque in locis humidis totius Provinciae. Fl. martio, aprili.

#### ENNEANDRIA.

1262. *MERCURIALIS perennis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 809.*

Oritur in sylvis collinis et montanis; frequens in montibus *Canzo*, *Griante* &c. Fl. aprili, majo.

1263. *MERCURIALIS annua* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 810.*

Vulgatissima species reperitur ubique. Fl. majo, junio.

#### MONADELPHIA.

1264. *JUNIPERUS communis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 853.*

Habitat in sylvis collinis et montanis totius Provinciae. Fl. junio.

1265. *JUNIPERUS nana* Willd. *spec. pl. T. 4. p. 854.*

Incolit montem *Legnone*, ubi invenitur inter saxa superata *Abietis* regione. Fl. julio.

1266. TAXUS *baccata* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 856.*

Reperitur in sylvis montanis di Nesso, Bellagio, Esino ec. Fl. aprili.

1267. RUSCUS *aculeatus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 874.*

Communis in sylvis collinis et montanis etiam circa Comum. Fl. aprili, maio.

## CL. XXIII. POLYGAMIA.

### MONOECIA.

1268. VERATRUM *album* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 895.*

Nascitur in pratis montium totius fere Provinciae inter Fagi et Abietis regiones. Fl. junio, julio.

1269. ANDROPOGON *Gryllus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 905.*

Habitat in pratis collinis siccis etiam circa Comum. Fl. maio, junio.

1270. ANDROPOGON *Ischaemum* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 921.*

Communis in locis aridis rupestribus, atque in muris propugnaculorum urbis. Fl. maio, junio.

1271. HOLCUS *halepensis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 952.*

Vidi et legi in collibus circa Comum. Fl. junio, julio.

1272. HOLCUS *mollis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 955.*

Crescit in pratis siccis, atque ad sepes ubique. Fl. julio

1275. *HOLCUS lanatus* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 955.  
Vulgaris in pascuis arenosis tam collinis quam planis.  
Fl. junio, julio.
1274. *VALANTIA pedemontana* Willd. spec. pl.  
T. 4. p. 949.  
Provenit ad margines agrorum herbidos in collibus  
circa Comum, a Garzola, S. Agostino, Cardano,  
Cannago ec. Fl. majo, junio.
1275. *VALANTIA Aparine* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 950.  
Haud infrequens est in arvis cultis praesertim collinis.  
Fl. junio.
1276. *VALANTIA Cruciata* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 951.  
Vulgatissima in sepibus, dumetis, atque sylvis. Fl.  
aprili, majo.
1277. *VALANTIA glabra* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 952.  
Nascitur in sylvis, atque ad sepes collium circa Co-  
mum. Fl. majo, junio.
1278. *PARIETARIA officinalis* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 4. p. 955.  
Occurrit in ruderatis, ad muros ubique. Fl. majo,  
junio, julio.
1279. *PARIETARIA judaica* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 954.  
Frequens in ruderatis, et in muris praesertim circa  
Comum. Fl. majo, junio.
1280. *ATRIPLEX patula* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 4. p. 964.

Oritur in cultis, in ruderatis, et circa casas pastorias in montibus. Fl. julio, agosto.

1281. ACER *Pseudo-Platanus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 985.*

Habitat in sylvis montium Vallis Intelvi, et alibi paullo ultra regionem Fagi. Fl. aprili, majo.

1282. ACER *campestre* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 989.*

Reperitur in sepibus, in sylvis, et colitur in vineis praesertim planitiei ad sustinendas vites. Fl. aprili, majo.

1285. CELTIS *australis* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 995.*

Provenit satis copiose inter scopulos ad oras lacuum Larii, et Verbani. Vidi etiam hanc speciem haud raram in sepibus *nella Brianza*, atque circa *Comun* et *Canzo*. Fl. majo, junio.

1284. FRAXINUS *excelsior* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 1099.*

Abundat in sylvis collinis et montanis. Fl. junio.

1285. DIOSPYROS *Lotus* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 1107.*

Vidi hanc speciem in sylvis montis *di S. Abbondio* prope *Comun*, et etiam *alla Camerlata* spontanea. An olim culta? Fl. majo, junio.

1286. FICUS *Carica* Linn. *spec. pl. ed. Willd. T. 4. p. 1151.*

Spontanea haec species nascitur inter saxa, ad muros; ex ea plures coluntur *varietates* in hortis, atque in campis praesertim collinis.

## CL. XXIV. CRYPTOGAMIA.

## GONOPTERIDES.

1287. **E**QUISETUM *arvense* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 1.*

Habitat in arvis humentibus inter segetes. Fl. aprili.

1288. EQUISETUM *sylvaticum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 3.*

Crescit in sylvis umbrosis udis, atque in pratis uliginosis montium. Fl. aprili, majo.

1289. EQUISETUM *palustre* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 5.*

Abundat in pratis paludosis, atque in fossis ubique.  
Fl. majo, junio.

1290. EQUISETUM *hyemale* Linn. *spec. pl. ed.* *Willd.*  
*T. 5. p. 8.*

Vulgare in fossis, atque in locis sylvaticis uliginosis  
circa Comum. Fl. februario, martio.

## STACHYOPTERIDES.

1291. LYCOPODIUM *clavatum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 16.*

Reperitur in sylvis collinis et montanis Como vicinioribus, et alibi. Fl. junio, julio.

1292. LYCOPODIUM *complanatum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 19.*

Nascitur in sylvis collinis et montanis etiam circa  
Comum. Fl. julio, agosto.



CRYPTOGAMIA STACHYOPTERIDES 193

1295. LYCOPODIUM *annotinum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 25.*

Occurrit in sylvis montanis Vallium *Intelvi*, *Cavargna*,  
*Sasina* ec. Fl. junio, julio, agosto.

1296. LYCOPODIUM *helveticum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 55.*

Frequens in sylvis collinis et montanis circa *Comum*,  
et alibi. Fl. julio, agosto.

1297. LYCOPODIUM *Selago* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 49.*

Mihi obviam venit in sylvis montium *di Dongo*, *Vallis*  
*Cavargna* ec. Fl. junio, julio.

1298. OPHIOGLOSSUM *vulgatum* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 58.*

Haud rarum in sylvis et pratis humilibus etiam circa  
*Comum*. Fl. junio, julio.

1299. BOTRYCHIUM *Lunaria* Swartz. *Willd. spec. pl.*  
*T. 5. p. 61.*

*Osmunda Lunaria* Linn. *spec. pl. p. 1519.*

Oritur in pratis siccis montium *Vallis Intelvi ad*  
*Orimento* ec. Fl. junio.

1300. OSMUNDA *regalis* Linn. *spec. pl. ed. Willd.*  
*T. 5. p. 97.*

Habitat in sylvis humidiusculis circa *Comum*, et alibi.  
Fl. junio, julio.

FILICES.

1301. ACROSTICUM *Marantae* Linn. *spec. pl. ed.*  
*Willd. T. 5. p. 121.*

Provenit in rupibus ad arceam *Baradello* prope *Comum*.  
Fl. junio, julio.

1500. CETARACH *officinarum Willd. spec. pl. T. 5. p. 156.*  
*Asplenium Ceterach. Linn. spec. pl. p. 1558.*  
 Abundat in locis saxosis, atque in rupibus ubique.  
 Fl. majo, junio, julio.
1501. POLYPODIUM *vulgare Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 172.*  
 Vulgatissimum in sylvis, in locis umbrosis, atque arborum truncis. Fl. aestate.
1502. POLYPODIUM *Phegopteris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 199.*  
 Crescit in sylvis umbrosis circa Comum, a *S. Abbondio, Cardano* ec. Fl. junio, julio.
1503. POLYPODIUM *Dryopteris Linn. spec. pl. ed. Willd. T. 5. p. 209.*  
 Inveni in montibus *Como* imminentibus, a *S. Maurizio* supra *Brunate*, ad *Pertuso* ec. Fl. aestate
1504. ASPIDIUM *Lonchitis Willd. spec. pl. T. 5. p. 224.*  
*Polypodium Lonchitis Linn. spec. pl. p. 1548.*  
 Nascitur in sylvis aridis montium *Larii* lacus, atque in *Valle Intelvi*, etiamque in saxosis montis *di S. Abbondio* prope Comum. Fl. aestate.
1505. ASPIDIUM *aculeatum Willd. spec. pl. T. 5. p. 258.*  
*Polypodium aculeatum Linn. spec. pl. p. 1552.*  
 Haud infrequens est in sylvis ac nemoribus collium et montium circa Comum. Fl. junio, julio.
1506. ASPIDIUM *Filix mas Willd. spec. pl. T. 5. p. 259.*  
*Polypodium Filix mas Linn. spec. pl. p. 1551.*

Occurrit in sylvis umbrosis collinis et montanis. Fl. junio, julio.

1507. ASPIDIUM *fontanum* Willd. *spec. pl. T. 5*  
*p. 272.*

*Polypodium fontanum* Linn. *spec. pl. p. 1550.*

Reperi in saxosis humidiusculis montium *di Dongo*,  
atque *Vallis Cavargna*. Fl. junio, julio.

1508. ASPIDIUM *Filix femina* Willd. *spec. pl. T. 5*  
*p. 276.*

*Polypodium Filix femina* Linn. *spec. pl. p. 1551.*

Habitat in sylvis umbrosis etiam prope *Comum*. Fl.  
junio, julio.

1509. ASPIDIUM *rhaeticum* Willd. *spec. pl. T. 5*  
*p. 280.*

*Polypodium rhaeticum* Linn. *spec. pl. p. 1552.*

Cresecit in sylvis umbrosis montium *Vallis Cavargna*,  
*di Dongo*, *Mandello ec.* Fl. junio, julio.

1510. ASPIDIUM *fragile* Willd. *spec. pl. T. 5. p. 280.*  
*Polypodium fragile* Linn. *spec. pl. p. 1555.*

Oritur in locis sylvaticis saxosis montium etiam circa  
*Comum*. Fl. junio, julio.

1511. STRUTHIOPTERIS *germanica* Willd. *spec. pl.*  
*T. 5. p. 288.*

*Osmunda Struthiopteris* Linn. *spec. pl. p. 1522.*

Collegi in vallecula montis *di S. Abbondio*, quae est  
prope *S. Marta*, extra urbem. Fl. junio, julio.

1512. ASPLENIUM *septentrionale* Willd. *spec.*  
*pl. T. 5. p. 507.*

*Acrosticum septentrionale* Linn. *spec. pl. p. 1524.*

Nascitur inter saxa ad arcem *Baradello*, prope *S. Fermo*,  
et alibi. Fl. aestate.

1313. ASPLENIUM *Trichomanes* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 331.  
Vulgare in muris vetustis, atque in rupium fissuris.  
Fl. fere toto anno.
1314. ASPLENIUM *Ruta muraria* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 341.  
Frequentissimum in muris, atque in rupibus. Fl.  
aestate.
1315. ASPLENIUM *Adiantum nigrum* Linn. spec.  
pl. ed. Willd. T. 5. p. 346.  
Crescit in locis umbrosis humidis ad muros, ad rupes.  
Fl. aestate.
1316. SCOLOPENDRIUM *officinarum* Willd. spec.  
pl. T. 5. p. 348.  
Asplenium *Scolopendrium* Linn. spec. pl. p. 1557.  
Abundat in locis saxosis umbrosis humidis ubique.  
Fl. aestate.
1317. PTERIS *crispa* Willd. spec. pl. T. 5. p. 395.  
*Osmunda crispa* Linn. spec. pl. p. 1522.  
Reperitur in sylvis et nemoribus montium etiam  
circa Comum. Fl. junio, julio.
1318. PTERIS *aquilina* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 402.  
Comunis in omnibus Provinciae sylvis, et in pascuis  
montanis humidiusculis. Fl. junio, julio, agosto.
1319. PTERIS *cretica* Linn. spec. pl. ed. Willd.  
T. 5. p. 374.  
Haec species crescit prope pagos di *Urio*, *Briennio*,  
atque *alla Pliniana*. Fl. aestate.
1320. BLECHNUM *boreale* Swartz. Willd. spec. pl.  
T. 5. p. 408.  
*Osmunda Spicant* Linn. spec. pl. p. 1522.

Provenit in sylvis umbrosis humentibus circa Comum ,  
a S. Abbonio , Carlano , Valle di Vico ec. Fl.  
aestate.

1521. ADIANTHUM *Capillus* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 449.

Occurrit in rupium fissuris pluribus in Provinciae  
locis humentibus tam collinis, quam montanis. Fl.  
vere, aestate.

#### HYDROPTERIDES.

1522. SALVINIA *natans* Willd. spec. pl. T. 5.  
p. 556.

Crescit in aquosis, in fossis planitie, atque in palu-  
dibus di Colico. Fl. julio.

1525. MARSILEA *quadrifolia* Linn. spec. pl. ed.  
Willd. T. 5. p. 558.

Habitat in locis paludosis, copiosissima a Colico. Fl.  
julio.

FINIS.



## INDEX GENERUM.

## A

<b>A</b> cer . . . . .	Pag. 191.	Alsine . . . . .	Pag. 59
Achillea . . . . .	" 166.	Althaea . . . . .	" 133.
Aconitum . . . . .	" 104.	Amaranthus . . . . .	" 180.
Acrostichum . . . . .	" 193.	Amrygdalus. . . . .	" 93.
Actaea . . . . .	" 102.	Anagallis . . . . .	" 33.
Adiantum . . . . .	" 197.	Anarrhinum . . . . .	" 122.
Adoxa . . . . .	" 75.	Anchusa . . . . .	" 28.
Aegopodium . . . . .	" 57	Andropogon . . . . .	" 189.
Aesculus . . . . .	" 71.	Androsace . . . . .	" 30.
Aethusa . . . . .	" 55.	Anemone . . . . .	" 106.
Agave . . . . .	" 66.	Angelica . . . . .	" 53.
Agrimonia . . . . .	" 90.	Anthemis . . . . .	" 166.
Agrostemma . . . . .	" 87.	Anthericum . . . . .	" 64.
Agrostis . . . . .	" 13.	Anthoxanthum . . . . .	" 6.
Aira . . . . .	" 13.	Anthyllis . . . . .	" 136.
Ajuga . . . . .	" 111.	Antirrhinum . . . . .	" 121.
Alchemilla. . . . .	" 25.	Apargia. . . . .	" 148.
Alisma . . . . .	" 70.	Aquilegia . . . . .	" 105.
Allium . . . . .	" 61.	Arabis . . . . .	" 129
Alnus . . . . .	" 179.	Arbutus. . . . .	" 77
Alopecurus . . . . .	" 12.	Arctium . . . . .	" 153





Carduus . . . . .	Pag. 154.	Circaea . . . . .	Pag. 2.
Carex . . . . .	" 175.	Cistus . . . . .	" 103.
Carlina . . . . .	" 156.	Citrus . . . . .	" 145.
Carpinus . . . . .	" 183.	Clematis . . . . .	" 107.
Carum . . . . .	" 57.	Clinopodium . . . . .	" 117.
Castanea . . . . .	" 184.	Cnicus . . . . .	" 155.
Caucalis . . . . .	" 50.	Colchicum . . . . .	" 70.
Celtis . . . . .	" 191.	Colutea . . . . .	" 141.
Centaurea . . . . .	" 168.	Comarum . . . . .	" 101.
Cerastium . . . . .	" 88.	Conium . . . . .	" 50.
Ceratophyllum . . . . .	" 180.	Convallaria . . . . .	" 65.
Cercis . . . . .	" 76.	Convolvulus . . . . .	" 33.
Ceterach . . . . .	" 194.	Gonyza . . . . .	" 159.
Chaerophyllum . . . . .	" 55.	Cornus . . . . .	" 25.
Chara . . . . .	" 174.	Coronilla . . . . .	" 141.
Cheiranthus . . . . .	" 128.	Corylus . . . . .	" 183.
Chelidonium . . . . .	" 102.	Crassula . . . . .	" 60.
Chenopodium . . . . .	" 45.	Crataegus . . . . .	" 95.
Cherleria . . . . .	" 85.	Crepis . . . . .	" 152.
Chironia . . . . .	" 41.	Crocus . . . . .	" 8.
Chlora . . . . .	" 72.	Cucubalus . . . . .	" 83.
Chondrilla . . . . .	" 148.	Cucumis . . . . .	" 184.
Chrysanthemum . . . . .	" 165.	Cucurbita . . . . .	" 184.
Chrysosplenium . . . . .	" 77.	Cuscuta . . . . .	" 26.
Cicer . . . . .	" 139.	Cyclamen . . . . .	" 32.
Cichorium . . . . .	" 153.	Cynara . . . . .	" 156.
Cicuta . . . . .	" 55.	Cynoglossum . . . . .	" 29.
Cineraria . . . . .	" 163.	Cynosurus . . . . .	" 16.

Cyperus . . . Pag. 9.  
Cytisus. . . . " 140.

## D

Dactylis . . . " 15.  
Daphne. . . . " 73.  
Datura . . . . " 40.  
Daucus. . . . " 50.  
Delphinium . . " 104.  
Dentaria . . . " 126.  
Dianthus . . . . " 82.  
Dictamnus. . . " 76.  
Digitalis . . . . " 122.  
Dipsacus . . . . " 21.  
Diospyros . . . " 191.  
Dolichos . . . . " 137.  
Doronicum . . . " 165.  
Doryenium . . . " 144.  
Draba . . . . . " 124.  
Drosera. . . . . " 61.  
Dryas . . . . . " 101.

## E

Echinops . . . . " 169.  
Echium . . . . . " 30.  
Empetrum . . . . " 187.  
Epilobium. . . . " 71.  
Epimedium . . . " 24.

Epipactis . . . Pag. 173.  
Equisetum . . . " 192.  
Erica . . . . . " 72.  
Erigeron . . . . " 160.  
Eriophorum . . . " 10.  
Erodium . . . . " 131.  
Ervum . . . . . " 139.  
Eryngium . . . . " 48.  
Erysimum. . . . " 128.  
Erythronium . . " 63.  
Evonymus . . . . " 42.  
Eupatorium . . . " 157.  
Euphorbia . . . . " 91.  
Euphrasia . . . . " 120.

## F

Fagus . . . . . " 182.  
Festuca . . . . . " 16.  
Ficus . . . . . " 191.  
Fragaria . . . . . " 98.  
Fraxinus . . . . . " 191.  
Fumaria . . . . . " 134.

## G

Galanthus . . . . " 61.  
Galega . . . . . " 141.  
Galeobdolon . . . " 115.  
Galeopsis . . . . " 114.

Galium . . . . .	Pag. 53	Hottonia . . . . .	Pag. 31
Genista . . . . .	" 135	Humulus . . . . .	" 187
Gentiana . . . . .	" 46	Hyacinthus . . . . .	" 66
Geranium . . . . .	" 132	Hyoscyamus . . . . .	" 41
Geum . . . . .	" 101	Hypericum . . . . .	" 145
Gladiolus . . . . .	" 8	Hypochaeris . . . . .	" 152
Glechoma . . . . .	" 114		
Globularia . . . . .	" 20	<b>I</b>	
Gnaphalium . . . . .	" 158	Iberis . . . . .	" 125
Gratiola . . . . .	" 5	Ilex . . . . .	" 26
Gypsophila . . . . .	" 81	Impatiens . . . . .	" 43
<b>II</b>		Imperatoria . . . . .	" 56
Hedera . . . . .	" 44	Inula . . . . .	" 164
Hedysarum . . . . .	" 141	Iris . . . . .	" 8
Helianthus . . . . .	" 169	Isuardia . . . . .	" 25
Helleborus . . . . .	" 110	<b>J</b>	
Hemerocallis . . . . .	" 66	Jasione . . . . .	" 33
Heracleum . . . . .	" 53	Jasminum . . . . .	" 2
Herniaria . . . . .	" 45	Juglans . . . . .	" 182
Hesperis . . . . .	" 129	Juncus . . . . .	" 66
Hieracium . . . . .	" 149	Juniperus . . . . .	" 188
Hippocrepis . . . . .	" 141	<b>L</b>	
Hippophaë . . . . .	" 187	Lactuca . . . . .	" 147
Hippuris . . . . .	" 1	Lamium . . . . .	" 114
Holcus . . . . .	" 189	Lappago . . . . .	" 19
Holostemum . . . . .	" 20	Lapsana . . . . .	" 153
Hordeum . . . . .	" 19		

Laserpitium	Pag.	52.
Lathyrus . . .	"	138.
Laurus . . .	"	75.
Lemna . . .	"	174.
Leontodon . . .	"	148.
Leonurus . . .	"	117.
Lepidium . . .	"	124.
Leucoium . . .	"	61.
Ligusticum . . .	"	53.
Ligustrum . . .	"	2.
Lilium . . .	"	63.
Limodorum . . .	"	173.
Lindernia . . .	"	123.
Linum . . .	"	59.
Lithospermum	"	28.
Lolium . . .	"	18.
Lonicera . . .	"	38.
Lotus . . .	"	144.
Lunaria . . .	"	126.
Lupinus . . .	"	137.
Lychnis . . .	"	87.
Lycopodium . . .	"	192.
Lycopsis . . .	"	30.
Lycopus . . .	"	6.
Lysimachia . . .	"	33.
Lythrum . . .	"	90.

## M

Malva . . .	Pag.	133.
Marrubium . . .	"	116.
Marsilea . . .	"	197.
Matricaria . . .	"	166.
Medicago . . .	"	144.
Melampyrum . . .	"	120.
Melica . . .	"	14.
Melissa . . .	"	118.
Melittis . . .	"	118.
Mentha . . .	"	113.
Menyanthes . . .	"	32.
Mercurialis . . .	"	188.
Mespilus . . .	"	95.
Moehringia . . .	"	74.
Morus . . .	"	179.
Myagrum . . .	"	124.
Myosotis . . .	"	27.
Myriophyllum	"	180.
Myrtus . . .	"	93.

## N

Narcissus . . .	"	61.
Nardus . . .	"	10.
Neottia . . .	"	172.
Nepeta . . .	"	113.
Nymphaea . . .	"	103.

## O

Oenanthe . . . . .	Pag.	54.
Oenothera . . . . .	"	71.
Olea . . . . .	"	2.
Ononis . . . . .	"	136.
Onopordum . . . . .	"	156.
Ophrys . . . . .	"	172.
Ophioglossum . . . . .	"	193.
Orchis . . . . .	"	170.
Origanum . . . . .	"	117.
Ornithogalum . . . . .	"	63.
Orobanche . . . . .	"	123.
Orobus . . . . .	"	137.
Osmunda . . . . .	"	193.
Ostrya . . . . .	"	183.
Oxalis . . . . .	"	87.

## P

Paeonia . . . . .	"	104.
Panicum . . . . .	"	11.
Papaver . . . . .	"	102.
Parietaria . . . . .	"	190.
Paris . . . . .	"	75.
Parnassia . . . . .	"	59.
Pastinaca . . . . .	"	57.
Pedicularis . . . . .	"	120.
Peplis . . . . .	"	68.

Peucedanum . . . . .	Pag.	51.
Phalaris . . . . .	"	10.
Phaseolus . . . . .	"	137.
Phellandrium . . . . .	"	54.
Philadelphus . . . . .	"	93.
Phleum . . . . .	"	12.
Physalis . . . . .	"	41.
Phyteuma . . . . .	"	37.
Phytolacca . . . . .	"	89.
Pimpinella . . . . .	"	57.
Pinguicula . . . . .	"	5.
Pinus . . . . .	"	183.
Pisum . . . . .	"	137.
Plantago . . . . .	"	24.
Platanus . . . . .	"	183.
Poa . . . . .	"	14.
Polycarpon . . . . .	"	20.
Polyenemum . . . . .	"	8.
Polygala . . . . .	"	134.
Polygonum . . . . .	"	74.
Polypodium . . . . .	"	194.
Populus . . . . .	"	188.
Portulaca . . . . .	"	90.
Potamogeton . . . . .	"	26.
Potentilla . . . . .	"	99.
Poterium . . . . .	"	181.
Prenanthes . . . . .	"	148.
Primula . . . . .	"	31.

Prunella . . .	Pag. 119.
Prunus . . .	" 93.
Pteris . . .	" 196.
Pulmonaria . . .	" 29.
Punica . . .	" 93.
Pyrola . . .	" 77.
Pyrus . . .	" 96.
Pyrethrum . . .	" 165.

## Q

Quercus . . .	" 181.
---------------	--------

## R

Ranunculus . . .	" 108.
Raphanus . . .	" 130.
Reseda . . .	" 91.
Rhamnus . . .	" 41.
Rhinanthus . . .	" 119.
Rhododendron . . .	" 76.
Rhus . . .	" 58.
Ricinus . . .	" 184.
Robinia . . .	" 141.
Rosa . . .	" 97.
Rubus . . .	" 98.
Rumex . . .	" 68.
Ruscus . . .	" 189.
Ruta . . .	" 76.

## S

Sagittaria . . .	Pag. 181.
Sagina . . .	" 27.
Salix . . .	" 185.
Salvia . . .	" 6.
Salvinia . . .	" 197.
Sambucus . . .	" 58.
Samienla . . .	" 48.
Saponaria . . .	" 81.
Satureja . . .	" 112.
Saxifraga . . .	" 78.
Scabiosa . . .	" 21.
Scandix . . .	" 55.
Sherardia . . .	" 22.
Schoenus . . .	" 9.
Scilla . . .	" 64.
Scirpus . . .	" 9.
Scleranthus . . .	" 81.
Scelopendrium . . .	" 196.
Scorzonera . . .	" 147.
Scrophularia . . .	" 122.
Scutellaria . . .	" 118.
Secale . . .	" 19.
Sedum . . .	" 86.
Selinum . . .	" 50.
Sempervivum . . .	" 92.
Senecio . . .	" 161.

Serapias . . . . .	Pag. 172.	Tauacetum . . . . .	Pag. 157.
Serratula . . . . .	" 153.	Taxus . . . . .	" 189.
Seseli . . . . .	" 56.	Teuerium . . . . .	" 112.
Sideritis . . . . .	" 113.	Thalictrum . . . . .	" 107.
Silene . . . . .	" 83.	Thesium . . . . .	" 44.
Sisymbrium . . . . .	" 127.	Thlaspi . . . . .	" 125.
Sium . . . . .	" 54.	Thymus . . . . .	" 117.
Solanum . . . . .	" 41.	Tilia . . . . .	" 103.
Soldanella . . . . .	" 32.	Tofieldia . . . . .	" 70.
Solidago . . . . .	" 163.	Tormentilla . . . . .	" 100.
Sonchus . . . . .	" 147.	Tragopogon . . . . .	" 147.
Sorbus . . . . .	" 95.	Trapa . . . . .	" 25.
Sparganium . . . . .	" 175.	Tribulus . . . . .	" 76.
Spartium . . . . .	" 135.	Trifolium . . . . .	" 142.
Spergula . . . . .	" 89.	Triglochin . . . . .	" 69.
Spiraea . . . . .	" 96.	Triticum . . . . .	" 19.
Spinacia . . . . .	" 187.	Trollius . . . . .	" 110.
Stachys . . . . .	" 115.	Turritis . . . . .	" 129.
Staphylea . . . . .	" 59.	Tussilago . . . . .	" 160.
Stellaria . . . . .	" 84.	Typha . . . . .	" 175.
Stipa . . . . .	" 17.		
Struthiopteris . . . . .	" 195.		
Symphytum . . . . .	" 29.		
Syringa . . . . .	" 2.		

## T

Tamarix . . . . .	" 59.
Tamus . . . . .	" 187.

## U

Ulex . . . . .	" 136.
Ulmus . . . . .	" 46.
Urtica . . . . .	" 199.
Utricularia . . . . .	" 5.
Uvularia . . . . .	" 63.

## V

Vaccinium	Pag.	72.
Valantia . . .	"	190.
Valeriana . . .	"	7.
Vallisneria . . .	"	185.
Veratrum . . .	"	189.
Verbascum . . .	"	39.
Verbena . . .	"	6.
Veronica . . .	"	2.
Viburnum . . .	"	58.
Vicia . . . .	"	139.

Vinca . . .	Pag.	44.
Viola . . . .	"	42.
Viscum. . . .	"	187.
Vitis . . . .	"	44.

## X

Xanthium . . .	"	179.
Xeranthemum . . .	"	159.

## Z

Zanichellia . . .	"	174.
Zea . . . . .	"	175.





Pag.	7	Lin	10	Laculum	lege	Lacusculum
—	14	—	5	<i>caryophylla</i>	—	<i>caryophylla</i>
—	15	—	30	DACHILIS	—	DACEYFIS
—	36	—	25		—	El. julo. in u. l.
—	39	—	21	propy	—	propy.
—	48	—	10	laculum	—	lacusculum
—	53	—	15	flouentem	—	flouens.
—	57	—	25		omitte	ed. Willd
—	126	post lin.	11		lege	SILICUOSA

---

*Lex venit in hujus editionis tutelam, cum ejus  
jussis se praestiterit typographus.*

---











OK 3J2 C63  
Comoli Giuseppe Plantarum a Josepho Co gen  
3 5185 00024 9209

